

劉河間傷寒三書

上海千頃堂
書局發行

2

V. 2

Treatment of Pulmonary
Tuberculosis etc.

By Liou Ho Can.

Copy of an ancient
work in Chinese,
ca 1310 A.D.

Shanghai, 1968.

Vol. II

[D.]

1890

Received of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

[Signature]

黃帝素問宣明論方卷之六

傷寒方

河間 劉守真撰集 新安 吳勉學同校

抵當湯

治傷寒日深。表證乃其蓄熱下焦。脉微沉不結胸。發狂者。小腹脹而硬。小便自和者。瘀血證也。小便不和無血也。或陽明蓄熱內甚而喜忘。或狂。大便雖硬而反易。其色黑者。有蓄血也。無表裏證。但發熱日深。脉雖浮者。亦可下之。或已下後。脉數胃熱消穀善飢。數日不大便。有瘀血也。

桃仁

八箇

大黃

一分

水蛭炒

各十箇

去

右剉如麻豆大。分作二服。水一盞。煮半盞。絞去滓。溫服。未下再服。

抵當丸

治傷寒有熱。小腹滿。小便不利者。為有血也。當下之。不可餘藥。

桃仁

八箇

大黃

一分

水蛭炒

各七箇

去

右為末。蜜和作二丸。用水一小盞。煮一丸。至六分。溫服。臍時血未下再服。

大承氣湯

治表裏俱熱。病勢更甚者。陽明脉遲。汗出不惡寒。身重頭眩。半睡半醒。謂如見鬼狀。劇者。發則不識人。循衣摸牀。惕而不安。微喘。直視。陽明裏熱極甚。或吐下後不解。大便五六日。至十餘日。日晡潮熱。心胃燥熱而懊惱。復如瘧狀。脉沉實。或小便不利。大便乍難乍易。喘冒不能卧。或

腹滿實痛。煩渴譫妄。脉實數而沉。裏熱燥甚。腸胃悞鬱。留飲不散。胸腹高起。痛不可忍。但嘔冷液。

大渴反不能飲。強飲不能止。喘急悶者。

大黃

半兩

芒硝

半兩

厚朴

半兩

枳實

半兩

去

皮

實

右剉如麻豆大。分半水一盞。半生薑三片。煎至六分。內硝。煎去滓。服。

小承氣湯

治傷寒日深。恐有燥屎。腹中轉矢。乃可攻之。不轉矢者。必初硬後溏。未可攻之。攻之則

腹滿不能食。飲水而噤。其後發熱。大便復硬。若腹大滿不通。或陽明多汗。津液外出。腸胃躁熱。大

腹滿不能食。飲水而噤。其後發熱。大便復硬。若腹大滿不通。或陽明多汗。津液外出。腸胃躁熱。大

便必硬而譫語。脉滑吐下微煩。小便數。大便結。或下利譫語。自得病二三日。脉弱無太陽證。柴胡證煩心。心下結至四五日。雖能食少。少與承氣湯和之。今小安。

大黃 半兩 厚朴三錢 枳實三錢

右剉如麻豆大分作二服水一盞生薑三片煎至半盞絞汁服未利再服

調胃承氣湯

治諸發汗和解不惡寒但發熱蒸蒸然者或日深心下溫溫欲吐胸中痛大便溼腹滿鬱鬱微煩先此時吐下者或日深裏熱譫語法當下之以銀粉巴豆燥熱大毒丸藥下之致真陰損虛邪執轉甚因而協熱下利不止及表裏熱下之太早乘虛而入不成結胸但為熱利不止滿鞭或痛煩渴咽乾脉滑數而實諸腹滿實痛者煩渴譫妄小便赤大便鞭脉滑實緊

大黃 芒硝 甘草 各等

右剉如麻豆大分一半水一大盞煎至半盞絞去滓內硝煎不利再煎服

三一承氣湯

治傷寒雜病內外所傷日數遠近腹滿咽乾煩渴譫妄心下按之硬痛小便赤澀大便結澀或濕熱內甚而為滑泄熱甚喘咳悶亂驚悸狂顛目疼口瘡舌腫喉痺癰瘍陽明胃熱發斑脉沉可下者小兒熱極風驚門搖喘昏塞并斑疹黑陷小便不通腹滿欲死或斑疹後熱不退久不作痢或作斑紋瘡癰久不已者悌熱內成疹癰堅積黃瘦痛疾久新卒暴心痛風痰酒隔腸垢積滯久壅風熱暴傷酒食煩心悶亂脉數沉實或腎水陰虛陽熱獨甚而僵仆卒中一切暴音不語失詔蓄熱內甚陽厥極深脉反沉細欲絕或表之冲和正氣與邪熱并之於裏則裏熱亢極陽極似陰反為寒戰脉微而絕或風熱燥甚客於下焦而大小便澀滯不通者或產婦死胎不下及兩感表裏熱其煩可下者

大黃 半兩 芒硝半兩 厚朴半兩 枳實半兩 甘草一兩

右剉如麻豆大水一盞半生薑三片煎至七分內硝煎二服去滓服

十棗湯 治太陽中風下利嘔逆短氣不惡寒熱汗出發作有時頭痛心下痞硬引下痛兼下水腫腹脹并酒食積脹垢積滯瘕瘕堅積畜熱暴痛瘧氣久不已或表之正氣與邪熱并甚於裏熱極似陰反寒戰表氣入裏陽厥極深脉微而絕并風熱燥甚結於下焦大小便不通實熱腰痛及小兒熱結乳癖積熱作發驚風潮搐斑疹熱毒不能了絕者

大戟 芫花 慢火炒變色仲景卿俗異語云甘遂各等

右為末水一大盞棗十枚切開煮取汁半盞調半錢已實人每一錢

茵陳湯 治陽明裏熱極甚煩渴熱鬱留飲不散以致濕熱相搏而身發黃疸但頭汗出身無汗小便不利渴引水漿身心發黃宜茵陳湯調黃利大小便

茵陳蒿 一名茵陳 大黃 半兩 大梔子 七箇色深堅實好者稍小者用十箇

右剉如麻豆大水二盞半慢火煮至一盞絞汁溫服以利為度甚者再作當下如爛魚肚及膿血膠膠等物及小便多出金色如兒莢汁或見證將發黃此一劑分作四服調五苓散三錢凡

治發黃者無越此法妙

桂苓甘露散 一名桂苓白朮散 治傷寒中暑胃風飲食中外一切所傷傳受濕熱內甚頭痛口乾吐瀉煩渴不利間小便赤澀大便急痛濕熱霍亂吐下腹滿痛悶及小兒吐瀉驚風

茯苓 一兩 甘草 二兩 白朮 半兩 澤瀉 一兩 官桂 半兩 石膏 二兩 寒水石 二兩 滑石 四兩 猪苓 半兩

右為末每服三錢溫湯調下新水亦得生薑湯尤良小兒每服一錢同上法

此藥下神金丸止瀉痢無不驗也并

解內外諸邪所傷濕熱又一方却

梔子蘘皮湯 治頭微汗小便利而微發黃者濕熱相搏微者宜服

黃蘗 半兩 甘草 一分 大梔子 十五個

右剉如麻豆大水三盞煎至一盞絞汁分次作一日溫服之

梔子湯 治懊憹煩心反傷不得眠燥熱怫鬱於內而氣不宣通胸滿痛頭微汗虛煩

大梔子 七箇豆豉半合俗言鹽豉少氣者加甘草一分嘔者誤以丸藥下之

右剉如麻豆大或先以水二盞煮梔子至一盞半內豉煮至半盞絞汁溫服凡加者皆用梔子

凡用梔子湯皆非吐人之藥以其燥熱鬱結通津液宣行而已故不道再服也

大陷胸湯 治汗下之後不大便五六日舌乾而渴日晡潮熱從心至小腹脹滿而痛不可近脉當

沉緊滑數或但胸結則無大段熱頭微汗出脉沉滲者水結也

大黃 三錢芒硝 三錢甘遂末 三錢

右剉如麻豆大分作二服每服水一盞煎大黃至六分內硝一二沸絞汁調甘遂一字半七溫

服未快利再服執意不能利以意加服

小陷胸湯 治小結胸心下按之痛脉浮而滑無大段熱表未罷不可下之下之即死小結胸宜服

半夏 四錢湯洗生薑 二錢黃連 二錢栝樓實 大者半兩惟剉其殼子則全用不到

右以水三盞煮栝樓汁一盞半內藥至一盞絞汁兩次溫服即效

大陷胸丸 治發熱而下之太早熱入因作結胸者項亦強如柔痙狀下之則和也

大黃 半兩芒硝 一分杏仁 十二個去皮尖雙葶藶 三錢微炒

右大黃為末下葶藶杵羅研杏仁硝如泥和彈子大每服一丸入甘遂末三字白蜜半匙水一

盞煮至半盞溫服當一宿許乃下未利再服

梔子厚朴湯 治傷寒下後心煩腹滿坐卧不安者

大梔子 七個枳實 二錢厚朴 半兩去皮炙

右剉如麻豆大以水一盞半煮絞汁半盞溫服

檳榔散 治傷寒陰病下之太早成痞心下痞滿而不痛按之軟虛也

檳榔 枳殼 等分

右為末每服三錢煎黃連湯調下不計時候溫服

大黃黃連瀉心湯 治傷寒成病痞不已心腹亦實熱煩滿或譫妄而脉沉無他證者

大黃 黃連 黃芩 生薑 各一分 又法加

右剉如麻豆大水二盞煎至一盞絞汁分三次溫服

黃連解毒湯 治傷寒雜病躁熱毒煩悶乾嘔口燥吟呻喘滿陽厥極深畜熱內甚俗妄傳為陰毒

者及汗下吐後寒涼諸藥不能退熱勢兩感證同法

黃連 去鬚黃蘗 黃芩 大梔子 各半

右剉如麻豆大每服秤半兩水一茶盞煎至四分絞去滓溫服或腹滿嘔吐或欲作利者每服

加半夏三箇生厚朴二錢茯苓二錢去皮用水一盞半生薑三片煎至半盞絞汁溫服名半夏黃

連解毒湯

白虎湯 治傷風自汗桂枝證表未解半斑於裏中暑自汗脉虛弱傷寒自汗脉滑數而實

表裏俱熱三陽合病腹滿身重口燥面垢譫語發黃厥逆自汗和解兩感解頭痛止自汗雜病時

疫未瀉發斑兼豆疱瘡疹伏熱

知母 半兩 甘草 一兩 粳米 一合 石膏 四兩

右剉如麻豆大抄五錢水一盞煎至六分去滓溫服無時候日三四服或眩欬嘔者加半夏半

兩紅皮半兩每服生薑三片煎服傷寒發汗不解脉浮者加蒼朮半兩名蒼朮白虎湯 汗吐

下後煩渴口乾脉洪大加人參半兩名人參白虎湯

賈同知已效方

石膏 四兩 知母 一兩 甘草 一兩

劉庭瑞已效方

知母半一兩 石膏四兩 粳米一合

崔宣武已效方

知母一兩 石膏三兩 甘草半一兩

右為末每服三錢水一盞入粳米二十五粒煎至六分未曾下胃熱發斑兼豆痘如液虛瘦加人參半兩白朮半兩頭痛加川芎荊芥各三錢咳嗽加半夏三錢桔梗一兩恍惚加人參三錢

茯苓半兩

涼膈散一名連翹飲子 治傷寒表不解半入於裏下證未全下後燥熱佛結於內煩心憤懣不得眠

藏府積熱煩渴頭昏唇焦咽燥喉閉口亦煩渴口舌生瘡欬唾稠粘謔語狂妄陽胃燥溢便溺閉結風熱壅滯瘡癰發斑驚風熱極黑陷將死

連翹一兩 山梔子半兩 大黃半兩 薄荷葉半兩 黃芩半兩 甘草一兩 朴硝一分

右為末每服二錢水一盞蜜少許同煎至七分去滓溫服虛實加減咽喉痛涎嗽加桔梗一兩

芥穗半兩 嗽而嘔者加半夏半兩 薑半兩 每服生血衄嘔血加當歸半兩 藥半兩 生地黃半兩 淋者加滑石四兩

茯苓一兩 去皮風眩加芎半兩 石膏三兩 防風半兩 酒毒加葛根一兩 荊芥穗半兩 赤芍藥半兩 川芎半兩 防風半兩 桔梗半兩 三歲兒可服七錢 或無熱甚黑陷腹滿喘急小便赤凡言加者皆自本方加也以上

人參石膏湯

治傷寒咳嗽不已心煩及風熱頭痛精神不利情憤宜服

人參一錢 石膏三兩 芎半兩 半夏二錢 白失半兩 茯苓半兩 甘草一兩 大梔子三錢 知母半兩

右為末每服一錢水一盞生薑三片煎至六分去滓溫服

崔宣明人參石膏湯 治傷寒頭痛心煩悶風熱并汗後餘熱自汗多清頭目定喘嗽

人參二錢 石膏一兩 川芎一兩 黃芩二錢 茯苓三錢 甘草半兩 防風三錢

右為細末每服五錢水一盞半煎至六分去滓溫服不計時候

雙解散 治風寒暑濕飢飽勞役內外諸邪所傷無問自汗汗後雜病但覺不快便可通解得愈小

兒生瘡疹使利出快亦能氣通宣而愈

益元散七兩 防風通聖散七兩

右二藥一處相和名為雙解散益元散方在痢門通聖散方在風門各七兩攪勻每服三錢水

一盞半入葱白五寸鹽豉五十粒生薑三片煎至一盞溫服

白朮散 治傷寒雜病一切吐瀉吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱保養衰老及治酒積嘔噦

白朮去皮 茯苓去皮 人參各半兩 甘草半兩 木香一分 藿香半兩 葛根一兩

右為末白湯調下二錢煩渴者加滑石二兩甚者加薑汁續飲之

四逆湯 治傷寒表熱未入裏誤以寒藥下之太早表熱不已入裏寒下利不止因表熱裏寒自利

急以溫裏利止又治少陰病脉沉下利厥逆煩渴嘔吐

甘草一錢 乾薑一分 附子半箇生去皮臍附子以半兩者佳小者力弱大者性惡

右剉如麻豆大水二盞煎至一盞絞汁溫服或畜熱深極而手足厥冷者不宜此方當以下之

茯苓半夏湯 治傷寒雜病一切嘔吐或喘咳疼痛痞滿頭痛者

茯苓去皮 半夏一分 生薑一分 取汁

一方加 黃芩一分 甘草一分 紅皮一分 去穢

治風痰

右剉如麻豆大水一盞煎至四分絞勻下生薑汁溫服不計時候

黃帝素問宣明論方卷之七

積聚論

河間 劉守真撰集 新安 吳勉學校正

素問曰積聚留飲。痞隔中滿。濕積霍亂吐下。癥瘕堅硬。腹滿皆太陰濕土。乃脾胃之氣。積聚之根也。積者不聚散者不化。留者不行。飲者停滯。痞者不通。隔者阻。斯疾通五臟六腑。陰陽變化興衰之制也。元則害承。通制極則反矣。

謂水得燥則消散而得濕則不消。乃為積飲也。謂人形精神與榮衛血氣津液出入流通。謂夫腠理閉密。乃為痞也。謂腸胃隔絕。傳化失常。而乃滯也。土主形體。腹滿於中央。乃曰中滿。以傳化失度。故甚則霍亂吐瀉也。癥者腹中主硬。按之應手。然水體柔順。而今乃堅硬如此者。元則害承。乃制也。瘕者中雖硬。而忽聚忽散。無其常。故其病未及癥也。經曰血不流而滯。故血內凝而乃瘕也。小腸移熱於大腸。乃為虛瘕。大腸移熱於小腸。謂兩熱相搏。則血溢而為伏瘕。血溢不利。月事沉滯。結不行。故行為虛瘕。謂虛與伏同。瘕與疝同。為傳寫誤也。世傳冷病。然瘕病亦有熱。或陽氣鬱結。怫熱壅滯。而堅硬不消者。世傳為寒瘕瘕也。或堅痞。腹滿急痛。寒主筋。痛急主筋。痛寒極血凝泣而反兼土化制之。故堅痞之腹滿。或熱鬱於內而腹滿堅結。痛不可忍者。皆可為寒。誤矣。誤矣。

何不以脉證辨之。凡諸疾病。皆有陰陽寒熱。宜推詳之。五臟六腑。四季皆有積聚。心之積名曰伏梁。在於臍上大如臂。上至於心。橫於心下。如屋梁。故曰伏梁。肝之積名曰貫。音貫。氣在左脇下。覆如杯。有頭足久不愈。令人瘕瘕。脾之積名曰痞氣。在胃脘。覆大如杯。久不愈。令人四肢不收。發黃疸食。不為膚肌。肺之積名曰息貫。結在右脇下。覆大如杯。久不愈。令人灑淅寒熱。喘咳發為肺癰。腎之積名曰贲。音奔。犯在於小腹。上至心下。如狍。贲走往來無定。久不愈。令人喘逆。發為骨痿。少氣乏力。此為五臟之積也。常究斯義。未可悉也。

傳其所勝者死傳不勝者可治假令肺病傳肝肝病傳脾脾病傳腎腎病傳心心病傳肺皆傳所勝五臟之氣虛而內外諸邪所侵故留稽不行遂成積聚其脉沉細而微者是也

木香三稜丸 治一切氣悶胸膈痞滿榮衛不和口吐酸水嘔逆惡心飲食不化肋脇疼痛無聞久新

青木香 破故紙 茴香 黑牽牛 甘遂 芫花 大戟 荊三稜 蓬莪朮 川練子

右件一十五味用好醋二升除縮砂木香餘藥入醋中浸一宿入鍋煮盡為度乾為細末醋麴

糊和丸如棗豆大每服五七丸食後加減看虛實隨湯水下

導氣枳殼丸 治氣結不散心胸痞痛逆氣上攻分氣逐風功不可述

枳殼去穢木通剉炒青皮去皮陳皮去白桑白皮炒蘿蔔子炒白牽牛炒黑牽牛炒莪朮煨

茴香炒荊三稜等分

右為末生薑汁打麴糊為丸如桐子大每服二十丸煎橘皮湯下不計時候

透膈寬腸散 治腸上壅實膈熱難行者

白牽牛一兩芒硝三兩川大黃二兩甘遂半兩

右為細末食後溫蜜水調下一錢虛實加減疎動止

密補固真丸 治脾腎真元損虛泄痢痰嗽噤痞水穀酸臭飲食無味臍腹疼痛肢體麻痺下虛痰

厥上實壅滯腎虛耳鳴脾虛困憊耳焦齒槁面鰲身悴目黃口燥髮墮爪退風虛偏枯中滿膈氣

一切脾胃虛證常服補養宣通氣血

天南星牛兩半夏製神麴 麥蘖 茴香炒荊三稜炮各一兩白附子 乾生薑

川烏頭生各一兩芭豆七箇牽牛三兩代赭石二兩官桂一分

右為末水和丸小豆大每服十丸加至五十丸溫水下除泄瀉外並加大黃一兩

木香丸

治和脾胃寬胃膈消痰逆止嘔吐進益美飲食

官桂

乾薑各半

木香一分

大黃

蓬莪茂

芫花

醋拌濕炒乾

枳殼

去穢

陳皮

各半

半夏二兩

牽牛

半斤取末四兩

茴香炒

芭豆四箇

右為末滴水為丸如小豆大每服二三十丸溫水下

軟金丸

治心胸腰腹急痛或淋瀝生後經病血刺痛

當歸

半兩

乾漆二錢

紅花一錢半

用輕粉

硃砂

粉霜

各一

三稜

二錢

右同研勻棗肉為膏和丸菜豆大新水下一丸病甚者加得利後減

泥金丸

治心腹急痛取久新沉垢積滯推陳致新

黃蘗

大黃

芭豆

五靈脂

各半

猪牙皂角

一分

輕粉

粉霜

硃砂

各一分

乾漆

一分

右研勻煉蜜拌得所杵千下丸菜豆大新水下一丸未利更加服

狀元丸

治膈氣酒膈酒積涎嗽腹痛吐逆痞滿

芭豆

五十各

神麴

半兩

半夏

一兩

雄黃

白麴

炒一兩

右研勻酒水丸小豆大細米糠炒變赤色食後溫酒汁下止嘔吐生薑湯下

玄胡丸

治積聚癥瘕解中外諸邪所傷

玄胡索

青皮

去白

陳皮

去白

當歸

木香

雄黃

別研

荆三稜

生薑

各一

右為末酒麴糊為丸如小豆大每服五七丸生薑湯下

又一方

無陳皮

生薑

有黃芪

一兩

檳榔

分兩

大延胡索散治婦人經病產後腹痛腹滿喘悶癥瘕癖塊及一切心腹暴痛

延胡索

當歸

芍藥

京三稜

川苦練

蓬莪茂

官桂

厚朴

木香

川芎

各一

桔梗

黃芩

大黃

各半

甘草

一兩

檳榔

二錢

右為龍骨各半兩如煎法煎服平人心急痛加本方得利尤良後常服

三稜湯

治癰疽疔瘡積聚不散堅滿痞隔食不下腹脹

荆三稜二兩白木一兩蓬莪朮半兩當歸半兩煨檳榔木香三錢

右為末每服三錢沸湯點服食後每日三服

消飲丸

治一切積聚癰疽氣塊及大小便結胸痛不能仰

天南星半夏芫花自然銅等分

右為末醋煮麪糊為丸如桐子大每服五七丸食前溫水下良久葱粥投之相虛實加減

除濕丹

治諸濕客搏腰膝重痛足脛浮腫筋脉緊急津液凝溢便溺不利赤癰疹疽癰發背疥癬

走注脚氣無首尾瘡癰功效不可盡述

檳榔甘遂葦靈仙赤芍藥澤瀉葶藶二兩乳香沒藥一兩黑牽牛半兩大戟

炒二兩陳皮四兩

右為末麪糊為丸如桐子大每服五十丸至七八十丸溫水下後食如服藥前後忌酒一日藥

後忌濕麪食溫粥補暖

保安丸

治癰疽心腹內結如拳漸上不止搶心疼痛及遠臍腹痛不可忍者

川大黃三兩新水浸一宿乾薑一兩大附子半兩去鱗甲伏時灸令焙乾炒

右為末取三年米醋一大升先煎四五合然後和藥丸如桐子大每服十丸至二十丸空心醋

或酒米飲下後取積如魚腸膿血爛肉汁青泥當下

開結妙功丸

治怫熱內盛癰疽堅積腸結癰疽積聚疼痛脹悶作發有時三焦壅滯二腸閉結胸

悶煩心不得眠咳嗽喘逆不能食或風濕氣兩腿為腫脹黃瘦眼澁昏暗一切所傷心腹暴熱肝

腎燥鬱。偏正頭疼。筋脉拘攣。肢體麻痺。走注疼痛。頭目昏眩。中風偏枯。邪氣上逆。上實下虛。脚膝麻木不通氣血。

荆三棱炮 茴香各一兩 烏頭四兩 神麴 麥芽 大黃各一兩 好醋半升 熬成稠膏 乾薑二錢

巴豆二箇 破堅半兩 桂二錢 牽牛三兩

右為末。膏丸。小豆大。生薑湯下十九。十五丸。溫水冷水亦得。或心胃間。稍覺藥力。煖性。却減丸數。以加至快利。三五行。以意消息。病去為度。

木香分氣丸 治積滯癰塊不消。心腹痞結。疼痛。搶刺如覆杯狀。

陳皮去白 檳榔各一兩 破故紙炒 木香一兩 黑牽牛末二兩 炒香熟取

右為末。滴水為丸。如桐子大。每服二三十九。生薑湯下。食後臨卧服。

開胃生薑丸 治中焦不和。胃口氣塞。水穀不化。噎氣不通。噎塞痞滿。口淡吞酸。食時膨脹。噎逆惡

心。嘔吐痰水。宿食不消。咳嗽。儲肋刺痛。寬中開胃。進飲食。

桂心一兩 生薑一斤 切作片子 鹽三兩 青皮去白 陳皮去白 甘草炙 各二兩 縮砂仁四十九箇 廣茂

當歸各半

右為末。煉蜜為丸。如彈子大。每服一丸。食前細嚼。沸湯化下。

導滯定功丸 治一切心腹。卒暴疼痛。及胸中不利。消食止逆。定疼痛。

大椒 木香各一錢 蝎硝三錢 芭豆八箇 出

右為末。後入芭豆。霜研勻。醋麴糊和丸。如菜豆大。朱砂為衣。每服五丸。至十九。淡醋湯下。

積氣丹 治一切新久。沉積氣塊。面黃黑瘦。諸氣無力。癥瘕積聚。百吐酸水。

檳榔去節 芫花一兩 礪砂二錢 芭豆二錢 青皮去白 陳皮各三錢 蓬莪茂 雞爪黃連 京三稜

章柳根 牛膝各一兩 肉豆蔻三錢 大戟 川大黃 甘遂 白牽牛 乾薑 青礞石 乾漆

各半 木香二錢 石菖蒲三錢

右為末。醋麪糊和丸。如桐子大。每服一丸。臨卧燒棗湯下。每夜丸服後。有肚內作聲。病退為度。金露紫苑丸 治一切脾積兩肋虛脹。臍疼痛。

草烏頭 去皮夫 黃連半兩 官桂 桔梗 乾地黄 乾生姜 川椒 蕪荑 紫苑 去皮柴胡

防風 厚朴 甘草 人參 川芎 鱉甲 酒浸 貝母 枳殼 甘遂 各一 芭豆 半兩 酒煮 入礶砂 三生

右為末。水煮麪糊為丸。如桐子大。每服五丸。空心臨卧。米飲湯下。或微疎動。詳虛實加減。

信香十方青金膏 灌頂法。王子所傳。十二上願云。藥師瑠璃光如來。應當供養。正偏知。明行足。喜游世間。解無上土。調御丈夫。天人師。

佛世尊。方境授。治周身。中外陰陽不調。氣血壅滯。變生百病。乃至虛羸困倦。偏攻酒食。內傷心腹。

滿。寒急痛。或酒積。食積。癥瘕積。聚。瘕癖堅積。中滿。膈氣。食臭。酸醋。嘔吐。翻胃。或膈痺消中。善食而

瘦。或消渴。多飲而數。嘔也。角切。小便。或腸風下血。痔瘻冷痛。或胃癰疹。或偏身癰疽。惡瘡。或瘡毒已

入於裏。腹滿。嘔吐。或成瀉痢。或出惡瘡。疳肉。或下痢腹痛。或一切風氣。肢體疼痛。及中風偏枯。或

痰逆生風。痰涎嗽。兼產後腹痛。及小兒疳疾。諸風潮搐。但平人常服。補養宜行。榮衛調。飲食。

信砒 乳香 輕粉 粉霜 芭豆 以上各一 龍腦 半字 麝香 半字 青黛 二錢 同研 黃蠟 三錢

右研細末。蜜蠟入蜜半錢。就搓勻。旋丸。菜豆至小豆大。先服小丸。病在上。食後。在下。食前。在中。

不計時候。面東頂禮一丸。淨器盛水送下。如合藥。即淨處面東。每一丸念密呪三遍。或病人不

能呪。請人呪。

或師氏呪過 呪曰

信香十方青金膏。藥師圓成蜜遍拋。普濟有緣除百病。仰吞一粒體堅牢。

密呪曰

但言八金剛。

莫說十方佛。

五蘊六根俱不道。

十二上願自然成。

金黃丸

治酒積食積。諸積。面黃痘積。硬塊。

荆三稜

香附子

牛兩 澤瀉半錢

芭豆

四十九粒 出油

黍米粉

牽牛二錢半

右為末。用梔子煎湯和丸。如菜豆大。每服三丸。至五丸。如心痛。艾醋湯下。七丸。

逆氣丸

治心胸滿悶。脇肋刺痛。不思飲食。常服寬膈。進美飲食。

薑黃

四兩

香附子

四兩

縮砂

甘草

廣茂各二兩

丁香

木香

荆三稜各一兩

白檀

牛兩 藿香葉半兩

右為末。入菜豆粉二兩。用湯浸。蒸餅為丸。如桐子大。每服二三十丸。細嚼白湯下。食後日進三服。

丁香散

治瘧癘。氣腸下痞滿。息而不消。積而不散。元氣在胃。不妨食者。

好丁香

二十五個

白丁香

七十箇

密陀僧

舶上硫黃

黃鶯調

各五分

右為細末。每服一字。兒子煎湯調下。不計時候。治肚内生硬物。黑瘦如柴。嘔吐積滯。日服食後。

聖餅子

治一切沉積。氣脹兩脇。氣滿無問久新者。

大黃

三兩

黑牽牛頭末

一兩

礪砂

三錢

山梔子

牛兩

輕粉

二錢

右為末。煉蜜和丸。捻作餅子。如小錢大。厚槎食。後每服三餅子。細嚼溫酒下。臨卧如行粥補之。

虛實加減

無憂散

一名萬病散

治風痰瘡腫。疥癬。或臟腑積冷。壅滯氣結。風勞。膀胱宿冷。臟腑虛衰。面色痿黃。內有

癥瘕。并常煮。疳蟲。蛇蟲。攻心腹俱痛。忍中傷寒。頭痛。不忍。狀若山嵐。時氣。瘟疫之疾。並宜急服。

此藥宣通三五行。止瘧。或中風口喎。語多寒澁。睡後口中涎出。不限時節。不問男子。女人。但五日

一服。不過三服。永瘥。人患腰膝疼痛。脚氣腫滿。運動艱難。飲食無味。并小兒疳痢。胎肚者。量大小

與服和三五行自瘥。大人久泄氣痢狀若休息痢症有時俱一服取下。冷服一二升。當日見效。藥無四時冷熱。老幼衣弱病患。悉皆除之。任服他藥無妨。若常服時。蓋緣搜出臟腑中。積滯蟲膿。故也。無孕婦人久患血虛氣弱。痿黃無力者。亦可依方服。宣通氣候。殊不困倦。無妨此藥。凡有百病。並皆治之。其功不可具載。有孕婦人。或遇陰晦時。即不可服。天道晴朗。可進。雖若復疾而未愈者。可再服。

黃耆 木通 桑白皮 陳皮 各一兩 胡椒 白木 木香 各半兩 白牽牛 四兩 炒別

右七味為細末。每服二錢。牽牛末二錢。生薑二錢。切作片子。煎生薑湯一大盞。調藥須臾。又用生薑湯。或溫湯送下。平明可行三五次。快利無妨。如病瘥後。以白粥補之。痊矣。

五積丹 治心腹痞滿嘔吐不止破積聚者

白芩一銖一尺二寸火燒存性淨盒合 芭豆十二箇白麩一兩五錢同炒令黃色為度 右為末。醋麪糊為丸。菜豆大。每服十丸。鹽湯下。食後加減。

黃帝素問宣明論方卷之八

水濕門

夫諸濕者濕為土氣火熱能土濕也故夏熱則萬物濕潤秋涼則濕物燥乾也濕病本不自生因生於大熱沸鬱水液不能宣通即停滯而生水濕也凡病濕者多自熱生而熱氣尚多以為兼證云濕熱亦猶風熱義同雖病水寒不得宣行亦能為濕雖有此異亦以鮮矣或跗腫體寒而有水者以畜熱入裏極深非病寒也

三花神祐丸

治中滿腹脹喘嗽淋悶一切水濕腫滿濕熱腸垢沉積變生疾病久病不已黃瘦因

倦氣血壅滯不得宣通或風熱燥鬱肢體麻痺走注疼痛風痰涎嗽頭目旋運瘧疾不已癰疽積聚堅滿痞悶酒積食積一切痰飲嘔逆及婦人經病不快帶下淋瀝無問赤白并男子婦人傷寒濕熱腹滿實痛久新瘦弱俗不能辨別或汎常只為轉動之藥兼瀉久新腰痛并一切下痢及小兒驚疳積熱乳癖滿並宜服之

甘遂

大戟

芫花

醋拌濕炒各半錢

牽牛

二兩

大黃

一兩

為細末

輕粉一錢

右為末滴水為丸如小豆大初服五丸每服加五丸溫水下每日三服加至快利利後却常服病去為度設病愈後老弱虛人平人常服保養宜通氣血消進酒食病癖悶極甚者便多服則頓攻不開轉加痛悶則初服兩丸每服加兩丸至快利為度以意消息小兒丸如麻子大隨強弱增損三四歲者三五丸依前法

崔宣武神祐丸

加黃柏

一兩

牽牛

四兩

大黃

二兩

輕粉

二錢

甘遂

各一分

大戟

芫花

各一分

依前法

河間 劉守真 撰集
新安 吳勉學 校

劉庭瑞神祐丸 用此藥治水氣當得効。賈同知稱之不已。乃神仙奇絕之藥也。

葶藶木香散 治濕熱內外甚水腫腹脹小便赤澀大便滑洩。

葶藶 茯苓 皮去 猪苓 皮去 白朮 各一分 木香 錢半 澤瀉 木通 甘草 各半 辣桂 一分 滑石 二兩
右為末。每服三錢。白湯調下。食前。此藥下水濕消腫脹止洩瀉利小便。若小便不得通利而反轉泄者。此乃濕熱痞悶極熱而攻之不開。是能反為注泄。此正氣已衰而多難救也。慎不可攻之而無益耳。

白木木香散 治喘嗽腫滿欲變成水病者不能卧不敢食小便閉者。

白木 木猪苓 皮去 赤茯苓 甘草 澤瀉 各半 木香 檳榔 錢三 陳皮 二兩 官桂 二兩 滑石 三兩
右為末。每服五錢。水一盞。生薑三片。同煎至六分。食後去滓溫服。

大橘皮湯 治濕熱內甚心腹脹滿水腫小便不利大便滑洩。

橘皮 一兩 木香 一分 滑石 六錢 檳榔 錢三 茯苓 錢一 木猪苓 皮去 澤瀉 白朮 官桂 各半 甘草 二錢
右為末。每服五錢。水一盞。生薑五片。煎至六分。去滓溫服。二三日後再服此藥湯。

葶藶膏 治水腫腹脹。

牛黃 麝香 龍腦 各一 昆布 海藻 上同二 牽牛 桂心 各八 椒目 三 葶藶 六分
右為末。別搗葶藶熬成膏。丸如桐子大。每服十丸。日再服。稍利小便為度。詳虛實加減。

茯苓散 治諸般氣腫等疾。

芫花 炒 澤瀉 郁李仁 甜葶藶 漢防己 錢半 陳皮 白 白檳榔 瞿麥 各半 葉本 二錢
滑石 三分 大戟 分三

右為細末。每服一錢。取桑白皮濃煎湯。空心調下。取下碧淥水。如爛羊脂。即度。如未盡。隔日又服。腫消如故。不用服。忌鹽百日。

調胃散 治胸膈痞悶不思飲食脇肋硬痛消腹脹

半夏製 甘草炙 厚朴去皮 陳皮去白 藿香各等

右為末每服一錢生薑三片棗二枚水一盞同煎溫服食前

一氣散 治水氣蠱脹滿

白牽牛 黑牽牛各二錢

右為末用大麥麴四兩同一處為燒餅臨卧用茶湯一杯下降氣為驗

雄黃神金散

雄黃 葶藶一兩用糯米和 桑白皮已上各 澤瀉二兩 椒目 辟大戟 芫戟去心 茯苓去皮 芫花醋五升浸

甘遂 右為末從發時加減一分空心用井花水調下每服一錢加至五錢以利為度忌鹽醋生冷毒

物油膩血 從腳腫根在心加葶藶從肚腫根在腹加目椒從陰腫根在胸加澤瀉從膝腫根在肝加芫

花從面腫根在肺加桑白從心腫根在肋加雄黃從肢腫根在脾加甘遂從口腫根在小

腸加芫戟從腰腫根在腎加大戟從四肢腫根在肋加茯苓

萬勝散 治十種水氣不可愈者

海帶 海藻 海蛤 芫花醋浸 甘遂 大戟 甜葶藶 樟柳根 續隨子

芫戟各等分 右為末每服三錢至五錢溫酒調下臨卧問其再服

牽牛丸 治一切濕熱腫滿等疾

黑牽牛 黃芩 大黃 大椒 滑石各等

黑牽牛 黃芩 大黃 大椒 滑石各等

黑牽牛 黃芩 大黃 大椒 滑石各等

黑牽牛 黃芩 大黃 大椒 滑石各等

右為細末酒煮麴糊和丸如桐子大每服五丸至七丸生薑湯下食後虛實加減

梔子蘗皮湯治頭微汗小便利而微發黃者濕熱相搏微者宜服

大梔子箇十五黃蘗半兩甘草一分

右判如麻豆大水三盞煮至一盞緩十分三次作一日服溫喫不計時候

大戟丸治十腫水氣腫脹喘滿熱寒咳嗽心胸痞悶背項拘急膀胱繫腫於小腹小便不通反轉

大便澹泄不能坐卧

大戟為末芫花炒甘遂各一海帶各一海藻各一郁李仁續隨子各半兩樟柳根一兩已

五錢七分便入後藥硃砂輕粉錢各一粉霜錢各一水銀砂子一皂子大龍腦半錢

芭豆主用去皮

右八味已下同研勻用棗肉為丸如菴豆大每服五丸至七丸龍腦臘茶送下食後臨卧虛實

加減

粉霜丸治病水鼓滿不食四肢浮腫大小便閉不進飲食

粉霜硃砂海蛤寒水石粉玄精石白丁香頭白麴各一輕粉海金沙錢一

右研勻着紙裹數重上使麴裹又紙裹冷酒煎了桑柴火燒麴熟為度宿飯餅和丸如桐子大

每服三九生薑湯下一日三服二日加一丸至六日不加即止以補之妙

苦葶藶丸治一切水濕氣通身腫滿不可當者

人參二兩苦葶藶四兩上炒黃色為度

右二味同為細末用棗肉和丸如桐子大每服十五丸煎桑白皮湯下日進三服空心食前

此藥恐君子不信試驗之

肉豆蔻丸治水濕脹如鼓不食者病可下

肉豆蔻 檳榔 輕粉 各一黑頭牛一兩半
右為末 麪糊為丸 如菜豆大 每服十丸 至一十丸 煎連翹湯下 食後日三服

宣明論方

卷八

黃帝素問宣明論方卷之九

河間 劉守真 撰集
新安 吳勉學 校

痰飲門

痰飲論

夫嗽者五臟皆有嗽皆因內傷脾胃外感風邪皮毛屬肺風寒隨玄府而入湊理開張內外相合先傳肺而入遂成咳嗽逆肺熱也寒化熱熱則生痰喘滿也經云喉中介介如梗狀甚則嗽血也胸滿氣喘痰盛稠粘皆肺氣熱也

大人參半夏丸 治化痰降逆止嗽定喘諸痰不可盡述嘔吐痰逆痰厥頭痛風氣偏正頭疼風壅

頭目昏眩耳鳴鼻塞咽膈不利心腹痞滿筋脉拘攣肢體麻痺疼痛中風偏枯咳唾稠粘肺痿勞

虛人保養宜通氣血調和臟腑進飲食

人參 茯苓皮去 天南星 薄荷葉各半兩 半夏 乾生薑 白礬生 寒水石各一兩

蛤粉一兩 藿香葉分

右為末麵糊為丸如小豆大生薑湯下二三十丸食後溫水亦得一法加黃連半兩黃蘗二兩

米丸取効愈妙治病酒調和藏尤宜服之

新添半夏瓜蒌丸 治遠近痰嗽煩喘不止者

半夏生薑製 瓜蒌 杏仁去皮 麻黃 白礬生 款冬花各等分

右為末生薑汁打麵糊為丸如梧子大每服二十丸煎生薑湯下不計時候

白朮厚朴湯 治痰嘔不散利胸膈除寒熱美飲食

白朮 甘草炙 葛根各一兩 厚朴半兩

右件為末。每服一二錢。水一大盞。生薑五片。煎至六分。去滓。食前服。顯仁丸。仙術芎散。大人參半夏丸。

橘皮半夏湯 治痰壅涎嗽。久不已者。常服養液潤燥。解肌熱。止咳嗽。

橘皮半兩 半夏二錢半 湯

右為末。分作二服。每服水一盞半。入生薑十片。同煎至七分。去滓。溫服。

知母茯苓湯 治肺痿。喘咳不已。往來寒熱。自汗。

茯苓去皮 甘草各一兩 知母 五味子 人參 薄荷 半夏洗士 柴胡 白朮 欬冬。花

桔梗 麥門冬 黃芩兩半 川芎錢三 阿膠炒三錢

右為末。每服三錢。水一盞半。生薑十片。同煎至七分。去滓。稍熱服。

人參潤肺湯 治肺氣不足。喘急咳嗽不已。并傷寒。一頭疼。增寒。增壯熱。四肢疼痛。

人參 桔梗 白芷 麻黃去節 乾薑 白朮 甘草各一兩 白蘆半兩

右為末。每服二錢。水一大盞。生薑三片。葱白二寸。煎至八分。如出汗。連進二服。通口溫服。

杏仁半夏湯 治肺痿。涎喘不定。咳嗽不已。及甚者。往來寒暑。

杏仁去皮 桔梗 陳皮去白 茯苓去皮 漢防己 白礬桑白皮各錢三 薄荷錢一 甘草錢二 猪牙皂角錢一

右為末。作二服。水二盞。生薑三片。煎至六分。去滓。食後溫服。

防己丸 治肺不足。喘嗽久不已者。調順氣血。消化痰涎。

防己二錢 杏仁三錢 木香二錢

右為末。煉蜜為丸。如小豆大。每服二十丸。前桑白皮湯下。如大便閉。加葶藶一兩。食後服。

葶藶散 治肺氣喘滿。痰嗽。眠叶不安。不思飲食。

苦葶藶 蛤粉各錢三 桑白皮 山梔子 人參 荊芥穗 薄荷葉 赤茯苓去皮 陳皮 桔梗

杏仁 甘草各半兩

右為末每服三錢水一大盞入生姜三片煎至六分去滓溫服食後

保安半夏丸 治久新諸嗽止上逆涎喘短氣痰鳴咽乾煩渴大小便澀滯肺痿勞劣心腹痞滿急

痛中膈氣上竇下虛酒食積聚不消補養氣血宣行榮衛

半夏 天南星各半兩 牽牛兩 大黃半兩 黃蘗半兩 蛤粉一兩 芭豆四箇

右為末水為丸如小豆大每服十九十五丸溫水下食後日三服孕婦不可服又方無芭豆有

乾薑一錢半

人參保肺湯 治五勞七傷喘氣不接涎痰稠粘骨蒸潮熱

人參 柴胡 當歸 芍藥 桑白皮 知母 白朮 川芎 黃耆 紫苑 荊芥

地骨皮各一兩 茯苓去土 黃芩 連翹 大黃 薄荷各半兩 甘草 桔梗各一錢 石膏

滑石 寒水石兩半

右為末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服泄者去大黃同人參半夏丸服

神應丹 治涎嗽喘滿上攻心腹卒痛及利下血兼婦人帶下病一切脇脇痛滿

薄荷葉 甘草四錢 芭豆性溫 盆硝各二錢 輕粉二錢 豆豉一兩 五靈脂二兩

右為末煉蜜為丸如桐子大每服一丸溫酒下續後空曠律三五次禁飲食少時覺咽喉微

暖効心腹急痛溫酒下二丸末効再服得利尤良帶下以溫酒下二丸或大便流利再服

人參散 治身熱頭痛積熱黃瘦肌熱惡寒畜熱發戰膈熱嘔吐煩渴濕熱瀉利或目赤口瘡咽喉

腫痛或風昏眩虛汗肺痿勞嗽不已者

石膏 甘草各兩 滑石四兩 寒水石兩 人參半兩

右為末每服二錢溫水調下早晚食後兼服梔子金花丸 一名既濟解毒丸

宣明論方 卷九

寧神散 治一切痰嗽不已者。諸藥無効。世傳極驗。

御米囊一斤生 烏梅四兩

右為末。每服二三錢。沸湯點常服。食後日三服。

賈同知方 御米囊炒 烏梅肉 兩。依前法服之。康少尹傳。煎烏梅湯尤妙。

桂林白朮丸 治消痰逆止咳嗽。散瘧滿壅塞。開堅結。痛悶。推進飲食。調和藏腑。無問寒濕濕熱。嘔

吐瀉痢。皆能開發。以令遍身流濕。潤燥氣。液宣平而愈。解酒毒。療肺痿勞嗽。水腫腹漲泄瀉。不能

者。服之利止為度。隨證調之。

揀桂 乾生薑各 茯苓半 夏雨白朮 紅皮白 澤瀉各半

右為末。麵糊為丸。如小豆大。生薑湯下。二三十丸。日三服。病在膈上。食後。在下。食前。在中。不計

時候。或一法。更加黃連半兩 黃蘗二兩 水丸。取効愈妙。

潤肺散 治小兒肺熱咳嗽。痰喘甚者。久不瘳者。

瓜蔓實一枚去子用 右為末。以寒食麵和為餅子。炙黃為末。每服一錢。溫水化乳糖下。日三服。効乃止。

又方 治寒嗽 麻黃四兩 官桂一兩 蠟二錢

右為末。以蠟同煎。每服一二錢。溫服。

寧肺散 治一切寒熱痰盛。久新咳嗽不止者。

御米囊四兩 木瓜三兩 御米一處用蜜 五味子一兩 人參一兩 皂角二兩

右為末。每服二錢。烏梅兩 同煎。臨臥食服。大効。

蟹甲丸 治吐血咳嗽神効。

蟹甲一箇九助 柴胡一兩 酒 杏仁一兩 薑子 甘遂一兩 人參半兩

右為末煉蜜為丸如桐子大每服十九至十五丸煎生薑湯下

石膏散 治熱嗽喘甚者

石膏一兩甘草半兩炙

右為末每服三錢新汲水下入生薑汁蜜調下

人參半夏丸 治一切痰飲喘嗽不已

白礬 天南星 半夏各半兩甘草二錢人參二錢赤小豆四十粒杏仁四十粒猪牙兒角一

右為末秫米三升醋一升熬粥和丸如桐子大每服十五丸炒蘿卜子湯臨卧下

仙人肢丸 治遠年勞嗽不問寒熱痰涎喘滿先服松花膏下過多服此藥無不効

人參 沙參 玄參 紫團參 丹參 白朮 牡蠣 知母 甘草各二錢蛤蚧一對頭尾全

文火 炙黃色 右為末用麻黃十五斤去銀枸杞子三錢熬成膏丸如彈子大罇盒內盛臨卧煎生薑自然汁化下凡小兒量數加減

松花膏 治二三十年勞嗽預九月間宣利一切痰涎肺積喘嗽不利

防風 乾生薑 野菊花 芫花 枸杞子 甘草 蒼朮 黃精

右為末取黃精根熬成膏子和藥末丸如彈子大每服細嚼一丸冷水化下臨卧不喫夜飯服藥一粒

藥一粒

辰砂半夏丸 治小兒肺壅痰實咳嗽喘急胸膈痞滿公煩悶涎痰不利呀呷有聲

半夏半兩葶藶半兩成膏杏仁各半兩朱砂五靈脂微少

右為末更研勻生薑汁煮麵糊為丸如桐子大每服十五丸生薑湯下

大百勞散 治一切勞疾肌劣喘息不卧痰涎不食

蛤蚧一對元州鱉甲一箇附子一兩人參 柴胡 川乾薑 白茯苓去皮白朮 茴香 青皮

右為末每服二錢水一盞用生薑三片棗二枚烏梅二枚同煎空心稍熱服有汗加小麥二十粒不用鐵煎

小百勞散 治勞喘嗽不已自汗者

御米穀少炒多

五味子湯 治胸膈痞滿心腹刺痛短氣噎悶咳嗽痰唾逆惡心不思飲食温中益氣

五味子 治胸膈痞滿心腹刺痛短氣噎悶咳嗽痰唾逆惡心不思飲食温中益氣

右為細末每服一錢百沸湯點空心食前甚者自進三服

安神散 治遠年近日喘嗽不已

御米穀一兩人參 陳皮白甘一兩

右為末每服一錢煎烏梅湯調下臨卧服

勞門

白朮黃耆散 治五心煩自汗四肢疲劣飲食減少肌瘦昏昧

白朮 黃耆 當歸 黃芩 芍藥 石膏 甘草 茯苓 寒水石 各一分

人參 川芎 各三分

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓温服食前一日三服

黃連丸 治濕熱流運氣血不通壅滯不散清爽頭目

黃連 好者不拘多少

右為末。酒麴糊為丸。如小豆大。每服二十丸。溫水下。不計時候。日三服。必効散。治五勞七傷。勞役肌瘦。不思飲食。喘嗽不已。

川烏頭一兩生

天南星半兩生

右為末。每服二錢。蘿廬八地。如母指大。以水煮熟。去滓。食後服。嚙當歸地黃湯。治嗽血。衄血。大小便血。或婦人經候不調。月水過多。喘嗽者。

當歸

芍藥

川芎

白朮

染槐子

黃藥子

生地黄

茯苓

黃芩

白龍骨

各

右為末。每服三錢。水一盞。煎至七分。去滓。溫服。食前。

紫苑散。治勞體熱。心寒。脉滑短。咳嗽。婦人多有此疾。口乾。眼淚。骨疼。短氣。皆因腸胃燥滯。榮衛不能開發。玄府閉塞。熱鬱內餘。可以開發陰陽。宣通濕滯。和榮衛。順三焦。煎服人參白朮湯。

紫苑

桑白皮

桔梗

續斷

甘草

五味子

各一兩

赤小豆

一合

右為末。水一大盞。藥末五錢。青竹茹。彈子大。同煎至七分。溫服。去滓。枳實飲子。治婦人手足煩熱。夜卧多汗。肌肉黃瘁。經候不調。四肢煩倦。心腹滿悶。狀似勞氣。

枳實

一兩

吳半夏

浸一兩

湯洗七次

以生薑汁

紅芍藥

柴胡

各一兩

黃芩

半兩

右為末。每服二錢。水一盞。生薑三片。棗二枚。同煎至八分。去滓。溫服。及治五心煩熱。及身體壯執潮熱。續服桃仁煎丸。又治月經不調。阻滯不通。

桃仁

浸二兩

湯洗

川大黃

川朴硝

各二兩

蟲起

頭足

右為末。用醋五升。入金銀鑄內。以慢火熬成膏。可丸如桐子大。當日晚不食。夜飯。溫酒下一丸。不嚼。破午際取下。赤小豆汁似雞肝小蝦蟇衣。末再服。候鮮紅。即住服。

盧同散

治男子婦人一切咳嗽喘急。

欵冬花 井泉石 鵝管石 鍾乳石 官桂 甘草 白礬 佛耳草 各等分

右為末。每服一錢。竹筒子吸喫。日三服。立効。

焚香透膈散 治一切勞嗽。壅滯胸膈痞滿。

雄黃 佛耳草 鵝管石 欵冬花 各等分

右為末。每服用藥一錢。安在香爐子上焚着。以開口吸烟。在喉中立効。

黨靈神聖散 治男子婦人。久新日夜咳嗽不止者。

御米殼蜜炒一兩用 烏梅肉 揀人參 呵子肉 葶藶 桑白皮 各半兩

右為細末。每服二三錢。百沸湯發。臨卧調下。

新添三黃丸 治五勞七傷。流濕潤燥。消渴煩熱甚者。

大黃 黃芩 黃連 各等

右為末。煉蜜為丸。如桐子大。每服三三十九。加至五十丸。生薑湯下。不計時候。日三服。妙。

當歸木香湯 治婦人血氣虛勞。令人頭目昏眩。譫語聲沉重。舌根強硬。言語蹇澀。口苦不思飲食。

白日閒睡。夜發虛汗。神思恍惚。夢寐狂言。面色痿黃。頻發喘咳。遍身疼痛。骨節氣走。注四肢沉重。

背脾拘急。發寒熱。五心煩燥。唇乾多渴。胸膈不利。咽喉噎塞。疰羸瘦弱。經曰脉大為勞。宜服此藥。

青皮 五加皮 海桐皮 桑白皮 陳皮 地骨皮 丁香皮 牡丹皮 棕蘭皮已上諸藥全燒

為灰末用 當歸 一兩 木香 紅芍藥 半兩

右為細末。每服一錢。水一盞。入小油二點。錢一文。同煎至七分。溫服。如婦人血臟。臍下冷痛。似

刀攪。遍身腫滿。室女經脉不通。用斑蝥一兩。大黃一兩。炒剉二味。為末。用黃狗膽汁。以溫酒調

下一錢。如臍下痛止。心間痰未止。不服二味。

燥門

消渴論

燥乾者。今肺之本。燥金受熱。化以成燥。溢也。兼火熱。致金衰。耗液而損血。鬱而成燥者。由風能勝濕。熱能耗液。故經云。風熱火同陽也。寒濕燥同陰也。又燥濕小異也。金燥雖屬秋陰。而其性異於寒濕。而反同於風熱火也。又加大便乾。濕乃大腸受熱。化成燥。溢經云。諸溢枯渴。又如癰瘕中風。皆因火熱。耗損血液。玄腑閉塞。不能浸潤。金受火鬱。不能發聲。經云。肺主聲。肢痛。經疾者。風熱濕相致。而遂以偏枯。語音溢。手足不隨也。然中寒吐瀉。亡液而成燥。亦以鮮矣。亦有寒濕相鬱。榮衛不能開發。貫注多成偏枯。經曰。諸溢枯涸。乾勁。皺揭。屬於燥也。又加胃膈痺熱。煩滿。饑不欲食。或痺成消中。善食而瘦。或燥熱鬱甚。而成消渴。多飲而數。瘦或燥熱鬱甚。而成消渴。多飲而數。小便致。或因熱病。或恐酒欲。誤服熱藥。以狂陽心火。燥其三焦。陽胃燥。流涕鬱。而水液不能宣行也。則周身不得潤澤。故痺痺黃里也。而燥熱消渴。然雖多飲。亦其水液不能浸潤於腸胃之外。湯不能止。而便注為小便多出。俗未明妄為下。焦虛冷。誤人多矣。又如周身熱燥鬱。故變為雀目。或內障。癰疽瘡瘍。止為咳嗽喘下。為痔痢。或停積而濕熱。內不甚能傳化者。變為水腫濕脹也。世傳消渴病。及消瘦弱。或小便有脂液者。為消腎也。此為三消病也。消渴。消中消。腎經。意但皆熱之所致也。

人參白朮湯。治胃膈痺熱。煩滿。飢不欲食。痺成為消中。善食而瘦。燥熱鬱甚。而成消渴。多飲而數。小便兼療一切陽實陰虛風熱燥鬱。頭目昏眩。中風偏枯。酒過積毒。一切腸胃燥溢。倦悶壅塞。瘡疥痿痺。并傷寒雜病。產後煩渴。氣液不得宣通。

宣明論方 卷十

人參 白朮 當歸 芍藥 大黃 山梔子 荊芥穗 薄荷 桔梗 知母 澤瀉 各半

茯苓 連翹 瓜蒌根 乾葛 各二兩 甘草 二兩 藿香葉 青木香 官桂 各一分

石膏 四兩 寒水石 二兩 滑石 半斤

右為細末。每服抄五錢。水一茶盞。入盆硝半兩。生薑三片。煎至半盞。絞汁。入蜜少許。溫服。漸加至十餘錢。得臟腑流利。眼効如常。服以意加減。兼服消痞丸散。以散腸胃結滯。濕熱。內甚自利者。去了大黃芒硝。

絳雪散 治消渴。飲水無度。小便數者。大有神効。

黃芩 黃丹 漢防己 括蘆實 各半分

右為細末。每服二錢。湯漿水調下。臨卧併進三二服。即止。

人參散 治消腎善飲而食。後數小便溺者。

人參 三錢 白朮 澤瀉 瓜蒌 桔梗 梔子 連翹 各半 葛根 黃芩 大黃

薄荷 白茯苓 各一兩 甘草 半兩 石膏 二兩 滑石 寒水石 各三兩

右為末。入宿砂仁三錢。每服五錢。水一盞。煎至七分。入蜜少許。再煎二三沸。去滓。食前食後服。

消痞丸

大黃甘草子 治男子婦人一切消渴。不能止者。

大豆五升 先煮三沸出 大黃 半兩 甘草 大震者四兩 長四指打碎

右三味。用井水一桶。將前藥同煮三五時。如稠糲水少。更于豆軟。盛于盆中。故冷。令病人食豆。

渴食不論無時。時食。食後消渴。如若不止。再煮。藥不三

痢門

總論

痢者。五臟瘡毒而不散者。感冷物或胃寒。暑失。不能開發。久傷冷熱等食。更或服暖藥過極。鬱

化成功。自古入三口白利為寒赤利乃熱其三口悞也。亭入瘡節初發刺開乃血多日成膿何為先熱而後寒也。

叔和云濕多成五泄。腸走若雷奔。愚醫不悟三口黃者乃熱青利是寒大素曰五泄有澹泄鶩泄飧泄濡泄滑泄也。此乃五泄五泄者青是感肝木之象其色青赤者受心火之氣其色赤白者得西方金肺之氣色白黃者脾土之色蒼者土氣之下與水隨之其色蒼也三口蒼曰寒黃赤熱其三口非也。若下利熱極頻并蒼痛或久不愈諸藥不能止者須下之以開除濕熱痞閉積滯而使氣液宣行者宜以逐之兼宣利積熱也。

益元散 治身熱吐痢泄瀉腸癖下痢赤白。陰閉淋痛利小便。偏主石淋。乃服金石熱藥多待為腸胃中積聚寒熱宣積氣通九竅六府生津液去留結消畜水止渴寬中除煩熱心躁腹脹痛悶補

益五藏大養脾腎之氣。此腎木之藏非比腎木之府也理內傷陰痿安魂定魄補五勞七傷一切虛損主癰屋驚悸。其季初動健忘止煩滿短氣藏傷咳嗽飲食不下肌肉疼痛并口瘡牙齒痛蝕明耳目壯筋骨通

經脈和血氣消水穀保元真解百藥酒食邪毒耐勞役饑渴宣熱辟中外諸邪所傷久服強志輕身注顏延壽及解中暑傷寒疫癘饑飽勞損憂愁思慮患怒驚恐傳染并汗後遺熱勞復諸疾并解兩感傷寒能令遍身結滯宣通氣和而愈及婦人下乳催生產後損益血衰陰虛熱甚一切熱證兼吹妳乳癰此神驗之仙藥也。惟孕婦不宜服滑胎也。

桂府臚白滑石六兩甘災一兩

右為末每服三錢。蜜少溫水調下無靈日三服欲冷飲者新汲水調下解利傷寒發汗煎豆白湯調下四錢每服水一盞葱白五枚得下飯三服效為度此藥是寒涼解散鬱熱若病甚不解多服此藥無害但有益而無損俗惡性寒兼易得之賤物而不明素問造化之理故不取本草神驗之言而多不用焉。若以隨證驗之此凡人之仙藥也不可闕之。傷寒當汗而不可下當下不可汗者且如誤服此

藥則汗出自愈更熱便得宣通而愈或半右裏半在衣可和而不可減涼膈散和解為佳或人
 加蒼朮末三分若服上藥多愈亦滑石麻黃桂枝要發汗甚者小加減涼膈散不為汗者更
 白豆豉五服十枚同煎至微汗為度逼毒散可服太白散入麻黃二錢水煎服之妙藥也
 麻黃蒼朮水去節分三服取微汗為度逼毒散可服太白散入麻黃二錢水煎服之妙藥也
 服之則轉加大通毒散或解利兩感一服三服三服一承氣湯前一服調下錢四錢或下錢五錢
 粥催產用溫油漿或死胎不下者煎三服三服一承氣湯前一服調下錢四錢或下錢五錢
 產下皆由風濕或死胎不下者煎三服三服一承氣湯前一服調下錢四錢或下錢五錢
 不寒不熱不可溫之反欲結下者煎三服三服一承氣湯前一服調下錢四錢或下錢五錢
 臨時審其熱也為諸藥溫之反欲結下者煎三服三服一承氣湯前一服調下錢四錢或下錢五錢
 之常多其熱也為諸藥溫之反欲結下者煎三服三服一承氣湯前一服調下錢四錢或下錢五錢
 青黛全輕粉為効至大俗以病其標本如治之及此本藥今以黃丹是名之紅玉散若
 青黛碧色名碧玉散加薄荷葉同所名雞蘇散愚俗之妄侮慢耳
 玄青丸 治下痢勢惡頻并窘痛久不愈諸藥不能止須可下之以開除濕熱痞悶積滯而使液氣
 宣行者宣以逐之兼宣利積熱酒食積黃瘦中滿水脹腹脹兼療小兒散痞積熱乳癖諸證唯泄
 瀉者勿服

黃連

黃蘗

大黃

甘遂

芫花

炒

大戟

各半

牽牛

末二兩

已上同細末

輕粉

錢二

青黛

黃蘗

大黃

甘遂

芫花

炒

大戟

各半

牽牛

末二兩

已上同細末

輕粉

錢二

右為末勻水丸小豆大初服十九丸每服加十九丸空腹日午臨臥三服以快利為度後常服十五
 二十九數日後得食久病未痊除者再加取利後却常服以意消息病去為度後隨證止之
 小兒丸如黍米或麻子大退驚疳熱積不下者須常服十九丸
 阿膠梅花丸 治下痢無問久新赤白青黑疼痛諸證
 金井阿膠 淨草反炒透明白細烏梅肉炒去核黃蘗剉抄黃連 當歸 赤芍藥 乾薑 炮

金井阿膠

淨草

反炒

透明白

細烏梅肉

炒去核

黃蘗

剉抄

黃連

當歸

赤芍藥

乾薑

炮

赤茯苓等分

右為末入阿膠研勻。水丸桐子大。溫米飲下十丸。食前兼夜五六服。小兒九如菉豆。忌油膩脂肥諸物也。

牛黃神金丸

治大人小兒嘔吐瀉痢。無問久新。赤白諸色。或渴或不渴。小便澀或不澀。并小兒驚疳積瘕癰。兼積腹滿硬痛作發。往來亦能寬膈消食。

輕粉

粉霜

硃砂

雄黃

研朱砂

信砂

芭豆

去皮各

一錢

黃丹

蠟

三錢

右先研粉霜

次旋入硃砂

研細

下雄黃朱砂

信砂

再研下丹粉

研勻

別研芭豆

爛為油

與前藥

研勻

近火上炙

控熱

別研蠟

軟入藥

勻搓作劑

旋丸小豆大

新水下一丸

小兒黍米麻子大

止吐瀉痢疾

調甘露散

是桂苓

或益元散

亦得

芍藥

治一切濕熱

惡痢

頻年窘痛

無問膿血

並宜服之

黃藥

治一切濕熱

惡痢

頻年窘痛

無問膿血

並宜服之

黃連

各半

右為末

水丸如小豆大

溫水下三四十九丸

無時兼夜五六服

忌油膩脂發熱等物

二勝丸

治泄痢虛損

不問久新者

石同研為膏

丸如桐子大

每服三至五丸

米飲湯下

如未愈及赤白痢

腹滿腸痛更

與杏仁丸

鹽鼓

紫蘇

等分

治一切赤白瀉痢

腹痛裏急後重者

杏仁丸

治一切赤白瀉痢

腹痛裏急後重者

杏仁

四十箇

芭豆

四十箇

去皮

右以藥同燒存性

研細

如泥

用蠟鎔和

旋丸如桐子大

每服一二丸

煎大黃湯

間日一服

白朮聖散子

治一切瀉痢

久不瘥并婦人產後痢亦治

御米殼

蜜炒當歸

肉豆蔻

縮砂仁

石榴皮

訶子

乾薑炮

陳皮

白朮

白朮

甘草

芍藥

各等分

治一切瀉痢

久不瘥并婦人產後痢亦治

肉豆蔻

縮砂仁

石榴皮

訶子

乾薑炮

陳皮

白朮

甘草

芍藥

各等分

治一切瀉痢

久不瘥并婦人產後痢亦治

肉豆蔻

勝金膏 右為細末。每服二錢。水一大盞。入乳香。同煎和滓服。治一切泄瀉痢。不已胃脉洪浮者。反多日不已者。微小者。立止。

芭豆皮 楮實葉同燒存性

石為末。鎔蠟丸。如菜豆大。每服五丸。煎甘草湯下。

大聖金真散 治一切寒熱赤白瀉泄等痢疾。

御米穀半斤 甘草一兩 乾薑半兩 當歸 醋石榴皮一兩 陳皮去白 白茯苓去皮

右為末。每服二錢。水一盞。小兒半盞。乳香同煎至七分。食前忌油膩生冷毒物等。

車前子散 一名斷痢散。能治一切痢不止。

車前子不以多

右為末。每服二錢。米飲調下。食前空心。

象骨散 治脾胃虛熱。心腹脹滿。水穀不消。噫氣不消。食輒嘔吐。霍亂泄瀉。膿血。四肢沈重。臍腹疼

痛。裏夜起頻併。不思飲食。皆可治之。

象骨四兩 訶子二兩 肉豆蔻一兩 枳殼一兩 甘草二兩 乾薑半兩

右為末。每服三錢。水一盞。半煎至八分。和滓熱服。食前日三服。

海蛤玉粉散 治血痢解。藏中積毒熱。

海蛤不以多少

右為末。每服二錢。入蜜少許。冷水調下。不計時候。

河間 劉守真 撰集

安 吳學勉 人校

婦人門

總論

素問曰。目得血而能視。耳得血而能聽。指得血而能攝。掌得血而能握。足得血而能步。藏得血而能液。腑得血而能氣。然血所通流。則氣亦然也。氣血宣行。其中神自清利。而應機能用矣。故素問血氣人之神也。不可不謹調護。然婦人以血藏為基本也。夫婦人之病。手太陽足少陰。小腸之經絡為裏表。起自任衝之脉。於經脉之下。以上毛際循腹裏關元。上至咽喉。頤循面目。過帶脉。貫臍而止。以婦人月水一月一來。如期謂之月信。其不來。則風熱傷於經血。故血在內不通。或內受邪熱。脾胃虛損。以能飲食。食既不克。榮衛凝滯。肌膚黃燥。面不光澤。或大腸虛變為下痢。流入關元。致絕子嗣。為子藏冷。虛勞頹而病帶下。起與胞內。○夫帶下之造化。但分經絡。釋本殊異。為病之本氣也。其病所發。正在過帶之分。而淋瀝以下。故曰帶下也。赤白之說。無定也。法曰。頭目昏眩。口苦舌乾。咽喉不利。小便赤色。夫小便秘澀。滯脉實而數者。皆熱證也。凡白帶下者。亦多有之。為病寒。豈能然。素問亢則害。承迺制。謂亢過極而反。兼已勝之化制其勝也。則如火煉金。熱極則反化為水。及六月熱極。則物反出液。而濕潤林木流津。故肝熱則出泣。脾熱則出涎。肺熱則出涕。腎熱甚則唾。○大庄俗論。已煎熱湯。煮極則沸。熱甚。熱氣重蒸於物。而生津液也。故下部任脉。濕甚熱者。津液涌而溢。已為帶下。見俗醫白帶下者。但依方論。而用辛熱之藥。雖有誤中。致令鬱結熱聚。不能宣通。普病轉加。世傳誤之久矣。

人參白朮散

治偏身燥濕相搏。玄府緻密。遂令怫悖發渴。飲食減少。不為肌膚。

宣明論方

卷十一

人參三錢 白朮七錢 薄荷半兩 砂仁三錢 生地黄 茯苓去皮 甘草各半 黃芩一錢 滑石三兩 藿香三錢

石膏兩

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服食前日進二三服

白朮湯

治妊娠血液虛衰痿弱難以運動氣帶連痺麻榮衛不能通宣常服養液潤燥開通結滯

令血昌盛

白朮兩 寒水石

當歸

黃芩

芍藥

人參

石膏

乾薑

防風

縮砂

藿香 甘草

茯苓一兩

木香二兩

崔宣武方用白朮一兩

右為末

每服三錢水一盞生薑三片同煎五六分去滓溫服食前日三服

二氣湯

治月水不調斷絕不產面黃肌瘦虛弱不美食有燥熱以柴胡飲子相參服之

大黃

四兩別為末醋一兩 當歸二兩 白芍二兩

右為末

以膏子和丸如桐子大每服二十九丸淡醋湯下食前日進三服如月水不通加入乾膝三錢炒

沒藥半兩

硃砂三錢 官桂二錢 斑蝥三錢 此用熱不可生用則吐瀉

當歸龍骨丸

治月事失常經水過多及帶下淋瀝無問久新赤白諸證并產後惡物不止或孕婦

惡露胎痛不安及大小兒痢瀉並宜服之

當歸

芍藥 黃連 染槐子 艾葉炒各半兩 龍骨 黃蘗各一兩 茯苓半兩 木香一分

右末滴水為丸如小豆大溫米飲下三四十丸食前日三四服

當歸人參散

治產後虛損痿弱難以運動疼痛胸滿不思飲食

當歸

白朮 黃芩 芍藥 大黃 茯苓去皮 陳皮各半兩 人參 黃耆 劉川芎

厚朴去皮 官桂各三錢

甘草一兩 枳殼四錢 炒

右為末。每服三錢。水一盞。生薑三片。煎至六分。去滓。不計時服。溫服。如大便閉。以此散下。和中九。

增損四物湯 治月經不調。心腹疼痛。補血臟。溫經注顏。

川芎 當歸 芍藥 熟地黃 白朮 牡丹皮 各半兩 地骨皮 一兩

右為末。每服五錢。水一盞。煎至六分。去滓。溫服。食前。

當歸川芎散 治風壅頭目昏眩。痛悶。筋脉拘攣。肢體麻痺。保護胎氣。調和榮衛。

當歸 川芎 各半兩 甘草 二兩 黃芩 四兩 薄荷 兩 縮砂 仁 一分

右為末。溫水調下。香一錢。漸加至二錢。食後日進三服。

辰砂大紅丸 治產後寒熱。運悶。血氣塊硬。疼痛立止。

辰砂 一兩 一兩 一兩 附子 炮 沒藥 兩 海馬 半錢 乳香 沒蓉 肉桂 玄胡 薑黃

右為末。酒煮麴糊為丸。如酸棗大。每服一丸。煎當歸酒下。放溫經水不行。煎紅花酒下。

三聖散 治產後下血。痢不止。

烏魚骨 炒 燒綿灰 血餘灰 各等分

右為細末。每服前石榴皮湯調下。熱服一錢。

沒藥丹 治產後惡血不下。月候不行。血刺腰腹。急痛。或一切腸垢沈積。堅滿。痞痛作發。往來或燥

熱煩渴。喘急悶亂。肢體痛倦。大小人心腹暴痛。孕婦自利。惡物過多。不宜服。燥熱極甚。血液衰竭。

不可強行。宜調氣養血。細詳證用。

沒藥 一錢 當歸 大黃 一兩 牽牛 二兩 輕粉 一錢 官桂 一分 已上 硃砂 一錢

右研勻。錯麴糊為丸。如小豆大。每服五丸。至十丸。溫服下。以快利取積。病下為度。雖利後病未

痊者。後再加取利。止心腹急痛。煎乳香下。未止。取大便利。

黃藥子散 治月事不止煩渴悶亂心腹急痛股體困倦不美飲食

黃藥子 當歸 芍藥 生地黃 黃芩 人參 白朮 知母 石膏各一 川芎

桔梗各一 甘草一 紫苑 槐花子 柴胡

右為麤末抄三錢水一盞煎至七分濾汁食前但服一服

大延胡索散 治婦人經病并產後腹痛或心中煩悶或癥瘕癖塊及一切心腹暴痛

延胡索 當歸 赤芍藥 京三稜 川練子 蓬義茂 官桂 厚朴 木香 川芎各一

桔梗 黃芩 大黃各半 甘草一兩 檳榔錢

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓熱服食前日三服惡物過多去大黃官桂加入黃藥

子桑槐子龍骨各半兩如前法或平人心胃急痛如本方煎服得利尤好

枳實檳榔丸 治安養胎氣調和經候癥瘕痞塊有似妊孕可以久服血氣通和兼寬膈美食

枳實 檳榔 黃連 黃蘗 黃芩 當歸 阿膠 細研木香各半

右為末小和丸如小豆大溫米飲下三十九不計時候日進三服

軟金花丸 治心胸腹腰急痛或淋痛并產前後經病刺痛乾嘔氣勞往來寒熱四肢困倦夜多盜

汗兼治血積食積

當歸 焙 乾漆 二錢 輕粉 斑蝥 生全用 硃砂 粉霜 各一 芭豆 二錢

右為末同研細藥肉為膏旋丸如菜豆大每服一九新水下病甚者加服看虛實

大紅花丸 治婦人血積聚癥瘕經絡注滯

川大黃 紅花 各二 蠱蟲 十 隨去

右取大黃七錢醋熬成膏和藥丸如桐子大每服五七丸溫酒下食後日三服

黃芩湯 治婦人孕胎不安

白朮

黃芩各等分

右為末每服三錢水二盞當歸一根同煎至一盞稍溫服

海蛤丸

治婦人小便濁敗赤白帶下五淋臍腹疼痛寒熱口乾舌澀不思飲食

海蛤

半夏

芫花醋炒紅娘子去翅

訶子炒玄胡索

川練子去皮麝香炒

各

乳香

硃砂半入藥

沒藥各一

當歸半兩

量入病虛實加減

右為末

醋煮麵糊為丸如小豆大每服五丸至十丸醋湯下

烏金散

治婦人諸疾寒熱頭痛一切等疾

烏金子

肉桂

蒲黃

當歸

血餘灰

小蛭

鯉魚灰

木香

青皮

川頭半兩

皂角

芍藥

芫花

芭豆

出油朱砂少許

棕皮灰

紅花

雨

川頭

雨

右為末

每服半錢加至三錢煎生薑湯調下

伏龍肝散

治婦人血崩不止者或結作片者

芫蔚

生地黃

阿膠

當歸

地榆

刺薊根

伏龍肝

錢青竹茹

八錢

右為末

每服三錢水一盞半煎至一盞溫服日五服不計時候後服補藥

阿膠丸

阿膠

鱉甲

龍骨

地膽

鹿茸

烏魚骨

錢丹參

龜甲

一錢

右為末

醋麵糊為丸如桐子大每服三十丸湯下日進三四服

麝香杏仁散

治婦人陰瘕

麝香

杏仁

燒存性

右為細末

如瘡口深用小布袋子二箇盛藥滿繫口臨上藥災臨安在陰內立愈

硃砂斑貓丸

治婦人產後喫硬食變作血氣食塊無問久新

宣明論方

卷十一

皂角末二錢色豆四箇朱砂一錢硃砂一錢皂子乾蟬全一箇斑貓十箇紅娘子五箇水蛭三箇右為細末蜜和丸分作十五丸每服一丸至二丸三丸溫酒下初更喫平明取下血化水十年之病皆治之或大便或小便不多出也

黃帝素問宣明論方卷之十二

補養門

補養寒論

素問云。諸寒收引。皆屬於腎。腎者少陰也。少陰者。至陰也。至者為極也。少陰者。冬脈所旺。居比而屬水為寒。為歸藏為周密。寒中收引拘縮。寒之用也。其病上下所生水澄徹。冷清者。不濁其氣。寒冷水穀不消化。吐利清冷為病。則如天氣寒而水自清也。

素問云。太陽受寒。血凝為痼。太陰受寒。氣聚為疝。但脉急而寒之象也。急主於痛。故緊急也。又內經云。數則為熱。遲則為寒。諸陽為熱。諸陰為寒。脉當遲緩。寒毒內鬱。洪數為熱。所養心之脉也。寒氣生清水。清就於濕。故以下利清白。此乃腸胃寒化。物失常熱。則壅滯不通。寒勝則火衰。火衰金旺。吐利腥穢。腥者金肺之屬也。熱則喜酸。寒則水腥。只如四肢逆冷。堅痞腹滿。屈伸不便。禁固戰慄。謂陰水主之。舒倦不便。診其脉沈伏而遲。病之證也。若身涼不渴而寒。膝足而卧。惡聞人聲。不欲言。皆陰證也。陰陽停則和。偏則病。如陽氣暴絕。陰氣獨勝。則為寒證。陰氣暴絕。陽氣獨勝。則為熱證。經曰。陽盛陰虛。汗之而死。陰勝陽虛。下之而死。若陽實外熱。陰虛內寒。陰實內熱。陽虛外寒。陽實伐其陽。當涼膈散。承氣湯主之。陰實伐其陰。當白水散。四逆湯主之。

論曰

大凡治病。必求標本。受先者為本。次者為標。此為兼證。故知逆與從上行。無問知標本者。萬舉萬當。不知標本者。是謂妄行也。本病相傳。先以治其急。六氣為本。三陰三陽為標。故病氣為本。受病經絡藏府謂之標也。

河間問 劉守真 撰集
新安 吳勉學 校

補養類

防風當歸飲子

治脾腎真陰損虛肝心風熱鬱其陽勝陰衰邪氣上逆上實下虛怯弱不耐或表

熱而身熱惡寒或裏熱而燥熱煩渴或邪熱半在表半在裏進退出入不已而為寒熱往來或表
多則惡寒裏多則發熱或表之陽分陽和正氣與邪相助并甚於裏畜熱極深而外無陽氣裏熱
極其陽極似陰而寒戰腹滿煩渴者或裏之陰分正氣反助邪氣并甚於表則躁熱煩渴而汗出
也或邪熱壅塞者或煩熱痛者或熱結極其陽氣不通而反覺冷痛或中外熱鬱煩躁其喜涼畏
熱者或熱極開塞不得宣通陽極似陰中外喜熱而反畏寒者或躁熱煩渴者或濕熱極其而腹
滿不渴者或一切風熱壅滯頭目昏眩暗風眼黑偏正頭疼口乾鼻塞耳鳴及聾咽嗑不利或目
赤腫痛口瘡舌痺或上氣痰嗽心脇鬱痞腸胃燥逆小便溺淋悶或是皮膚瘡痒手足麻痺又或
筋脉拘急肢體倦怠或渾身肌肉跳動心忪驚悸或口眼喎斜語言蹇澁或狂妄昏惑健忘失志
及或腸胃燥熱佛鬱而飢不欲食或濕熱內餘而消穀善飢然能食而反瘦弱或誤服燥熱毒藥
及妄食熱物過多而耗損脾腎則風熱鬱甚而多有如此不必全見也無問自病及中燥熱毒藥
所使者並宜宣通氣血調順飲食久服之舊病除去新病不生設虛人常服補益功驗自可知矣

當歸

大黃

柴胡

人參

黃芩

甘草

芍藥

補枝

此方末為至當也

雙芝丸

治補精氣填骨髓壯筋骨助五臟調六腑久服注顏不老

熟地黃后取末

石斛酒洗根

五味子焙黃者剉

肉苁蓉酒浸

牛膝酒浸

杜仲酒浸

兔絲子酒浸

煨

鹿角霜二片

沉香三錢

麝香研

人參

白茯苓

桂覆盆子

乾山藥

木瓜

天麻酒浸

秦苑已上各一兩

薏苡仁炒

二兩

右為末煉蜜為丸如桐子大每服二十九至三四十丸溫酒下鹽湯米飲亦可 觀年五十八黑

附子以青鹽鹿角二大對去硫黃研所以上用些油釜中以水同煮令微沸勿大急甚水耗只從添溫火頭月以備添也凍令角膠汁出盡其角扣霜以手捻扣膩粉乃成之取用勿令穢

汚也

內固丹

治諸補養腎氣調和脾臟壽高者常服筋骨勁健澤如壯士

肉從容

酒茴香

神二破故紙

胡蘆芭炒芭戟去心

黑附子炮

川練子

胡桃仁各四兩

右為和研桃仁為膏餘藥末和勻酒麪糊為丸如桐子大每服十丸至三十丸溫酒鹽湯下食

前虛者加至五七十丸此藥明目補腎烏鬚進美食空心

大補丸

大補丸

治男子脾腎不足不聞久新者

陳蓮子

陳蘿蔔子已上炒

庭仁去破各

川山甲七片用

右為細末用蜜和丸如櫻桃大每服一丸溫酒送下食前空心

麝香少許

蛤蚧散

治脾胃氣攻心刺痛者

蛤蚧酒一對乳香木香白茯苓丁香茴香各一川山甲錢

蛤蚧散

治脾胃氣攻心刺痛者

蛤蚧

酒一對乳香

木香

白茯苓

丁香

茴香

各一

川山甲錢

金縷丹

金縷丹

治男子本藏虛冷夜夢鬼交者

龍骨

水飛免絲子兩破故紙

蓮子

澤瀉

牡蠣各半麝香少許

右為末酒麪糊為丸如桐子大每服三十丸溫酒下空心食前日三服

調中丸

治脾胃虛止嘔吐寬利胸膈

青皮

紅皮各一大黃一兩牽牛三兩

調中丸

治脾胃虛止嘔吐寬利胸膈

青皮

紅皮各一

大黃一兩

牽牛三兩

右為細末滴水如丸如桐子大每服三二十丸溫水空心食前下

水中金丹

治元藏氣虛不足夢寐陰人走失精氣

陽起石研 木香 乳香研 青鹽各一 茴香炒 骨碎補 杜仲各半 兩去皮 白龍骨一兩

右為細末酒麴糊和丸如皂子丸每服二丸溫酒下空心忌房室

和氣地黃湯 治沉積氣結不散調養禁衛補順陰陽常服以代湯茶酒果

木香 棟桂去皮 茯苓去皮 白芥子炒 各一錢 白木 乾山藥 川芎 當歸各一

桂花 縮砂仁各半錢 甘草半兩

右為細末入麝香少許研勻用數重油紙或簍器內密封起每用蜜二斤錫鉛一斤溫好甜水五升化勻開炒前藥并杏仁十枚去皮尖洗淨炒香煨槌碎濕地黃根許切長寸約取汁半盞

溫服

白朮調中湯

治中寒痞悶急痛寒濕相搏吐瀉腹痛上下所出水液澄澈清冷殺不化小便清白

乾薑炮 桂苓去皮 紅皮去白 澤瀉各半 乾薑炮 宮桂去皮 縮砂仁 藿香各一 甘草一兩

白朮

右為末白湯化密少許調下二錢每日三服煉蜜和就每兩作十丸名白朮調中丸小兒一服

分三服

人參白朮散

此方證同調中湯治法

人參

白朮 茯苓 甘草 橘皮 葛根 澤瀉 滑石 藿香各半

右為末每服三錢水一盞煎至六分溫服婦人加蒼朮三五片熱服

白朮散 治傷寒下後餘熱以藥下之大過胃中虛熱飲水無力也當生胃中津液多服此藥

人參 白朮 木香 白茯苓 甘草 乾薑 乾葛 各一兩

右為末每服一錢至二錢水一盞煎至五分溫服如飲水者多煎與之無時也

丁香附子散 治脾胃虛弱胸膈痞結吐逆不止

附子一兩 母丁香四十九個 生薑半斤取自然汁半碗

右用附子鑽孔四十九以丁香刺上面填內將生薑汁用文武火熬盡又用大蘿蔔一個取一穴子入附子又填內將蘿蔔蓋之又用文武桑柴火燒香熟為度取出切附子作片子焙乾搗為細末每服一錢米湯一盞調下日進三服

何首烏丸 治男子元氣虛損髮白再黑填精

何首烏半斤從蓉六兩牛膝四兩

右將何首烏半斤用棗一層何首烏甑內蒸棗軟用切焙同為末棗肉和丸如桐子大每服五七丸嚼馬練子服酒送食前一服加一丸日三服至四十九丸即止却減至數劫如神妙

川練子 馬練花 破故紙 胡蘆芭 茴香 等各

右除茴香外四味酒浸同為末煮麴糊為丸如桐子大每服十丸至二十丸溫酒下空心食前

神仙楮實丸 治積冷氣衝心胸及背有就蟲痠痛痔瘻瘰癧氣塊心腹脹滿兩肋氣急食不消化

上逆氣奔於心并疝氣下墜飲食不得吐水嘔逆上上氣咳嗽眼花少力心虛健忘冷風偏風等症坐則思睡起則頭眩男子冷氣腰痠膝痛冷痺風頑陰汗盜汗夜多小便洩利陽道衰弱婦人

月水不通小便冷痛赤白帶下一切冷疾無問大小能明目益力輕身補髓益精

楮實子一升淘去 官桂四兩 牛膝半斤酒 乾薑三兩 右為末酒麴糊為丸如桐子大每服二十丸溫酒空心食前鹽湯亦得

補中丸 治一切氣疾心腹痛嘔吐氣逆不思美食

厚朴生薑乾薑炮 陳皮去白 白茯苓去皮 甘草炙各

右為末煉蜜為丸如櫻桃大每服一丸空心白湯化下細嚼亦得

華澄茄丸 治中焦痞塞氣逆上攻心腹痛土逆湯下痢美飲食

華澄茄半兩 良薑二兩 神麴炒 青皮去白 官桂去皮各 阿魏半兩 麝香兩 麝香熟

右為末醋糊為丸如桐子大每服二十九生薑湯下不計時候

黃帝素問宣明論方卷之十三

諸痛門

總論

夫痛者。經脉流行不止。環周不休。寒氣入經而稽遲。血泣凝而不行。客於脉外。血少客脉中。氣不通。故卒然而痛。其痛者。卒然而止。或痛甚而不休。或痛甚而可按。或按之而痛止。或按之而無益。或喘痛動應手。或與心背相引。而痛。或脇肋與少腹相引而痛。或腹痛。或引陰股。宿昔而成積。或卒然而痛。死不知人。而少間復生。或痛而閉不通者。諸痛各不同形。經曰。寒氣客於脉外。則脉寒。脉寒則蹇。縮。蹇縮則脉絀。蹇。脉絀急。則外引小腹。衛氣不得通流。故卒然而痛。得炅則痛止。寒氣客於經脉之中。相薄則脉滿。滿則血氣亂。故痛而不可按。寒氣客於腸胃之間。膜原之下。血不得散。小腹急引。故痛。按之血氣散。痛乃止也。脇肋痛者。寒氣客於厥陰之絡脉也。背與心相引。痛者。寒氣客於背俞之脉。注於心相引。痛。寒氣客於陰股。血泣在小腹相引痛。卒然而痛死者。寒氣客於五臟。厥逆上壅。陰氣竭。陽氣未入。故卒然痛死。氣復反則生矣。視其色。色黃赤為熱。白青則為寒。青黑為痛。經曰。感虛乃陷下。其留於筋骨之間。寒多則筋攣骨痛。熱則骨弛肉消。但痛痒瘡瘍癰痛腫血聚者。皆屬心火也。不可一例傷寒。凡治痛者。先察本。次明經絡皮部虛實。用藥無悞矣。

神砂一粒丹

治一切厥心痛。小腸膀胱痛。不可止者。

附子也兩鬱金

橘紅

等附子停用

右為末。醋新糊為丸。如酸棗大。以硃砂為衣。每服一丸。男子酒下。婦人醋湯下。服罷又服散子。神聖代鍼散。

河間 劉守真 撰集
新安 吳勉學 校

乳香 沒藥 當歸 香白芷 川芎 各半 元青 足起去

右為細末更研每服一字病甚者半錢先點好茶一盞次摻藥末在茶上不得吹攪立地細細急之心驚欲死者小腸氣痛得如角弓膀胱腫硬一切氣刺虛痛并婦人血癖血迷血暈血刺血衝心胎衣不下難產一切痛疾服之大有神效只是要詳疾證用藥

茴香丸 治男子婦人臍腹疼痛刺胸膈不止者

茴香 炒 良薑 官桂 各半 蒼朮 十兩

右為末酒煮麪糊和丸如桐子大每服十丸生薑湯止痛溫酒下空心食後

起痛丸 治一切走注疼痛婦人經脉住滯水腫腹脹

甘遂 大戟 芫花 黑牽牛 各等

右為末以蕎麥同末和作餅子扞切為棋子煮熟服之得利為度每服一錢加減相虛實

六合散 治一切燥結汗後餘熱宣轉不通亦名金鑰匙散并治小腸氣結心腹滿胸中結痞走症

疼痛

大黃 一兩 紙裏煨 白牽牛 半兩 生 黑牽牛 微炒 甘遂 各半 檳榔 生 錢 輕粉 一錢

右為細末每服一錢密水調下服量虛實加減

定痛丸 治打撲損傷筋骨疼痛等如打撲骨損者先整骨定用竹夾然後先用好酒下麻黃三錢

然後服藥大効

乳香 一分 川椒 當歸 沒藥 赤芍藥 川芎 自然銅 玄胡

右為末鎔蠟為丸如彈子大細嚼酒下一丸骨碎者先用竹夾夾定三五日依舊小可與服

香散 治小腸氣臍腹攪痛急陰股中疼悶不省人事

舶上茴香 川鹽 炒 枳殼 各一 沒藥 半兩

右為末每服一錢溫熱酒下不計時候併二三服

金鐵丸亦名陸神丸 治陽絕痞氣心腹不忍者

丁香 木香 乳香 阿魏 輕粉 骨碎補 祛積柳 官桂 桂心

芭豆去皮 杏仁去皮 不灰木 肉豆蔻 陽起石 硃砂各等

右為細末水麝糊為丸如小豆大每服一丸針穿作孔子小油內裏過燈焰內燎遍於油中煎

死爵生薑下不計時候日三服虛實加減

一粒金丹 治腰膝走注疼痛如虎噬

草烏頭 五靈脂各一斤 木鱉子四兩 白膠香 泔地龍四兩去土炒 細墨一兩 乳香一兩

當歸二兩 沒藥二兩 麝香一錢 右為末再研一十下糯米麝糊和丸如桐子大每服一丸至二丸溫酒下喫藥罷遍身微汗有

驗

沒藥散 治一切心肚疼痛不可忍

沒藥別香 乳香各三錢 川山甲五錢炙 木鱉子四錢

右為細末每服半錢一錢酒大半盞同煎溫服不計時候

痔門

痔瘻總論

夫腸風痔病者所發手太陰手陽明經以應動脈謂肺與大腸為表裏主為傳道以行糟粕腸風痔病有五種其證亦異蓋因陽氣虛而玄腑疎風邪乘而熱自三風濕邪熱攻於腸中致使大便澀而燥熱鬱血熱散而流溢衝浸浚腸裏故以先血後便熱在下先便後血熱在上血後便久而不愈乃作痔

素問云。因而飽食。筋脉橫解。房室勞傷。腸癖為痔。風熱不散。殺氣流溢。傳於下部。故令肛門腫滿。結如梅。年核。甚者而變成瘻也。五臟切宜保養。勿令受邪。

香鼓丸 治濕熱內甚。因而飽食。腸癖成痔。久而成瘻。速服悉愈之。

木香 黃蘗各三錢 枳殼 煨厚朴 各半兩 黃連一兩 蜆皮 燒 當歸 四錢 荆芥穗 三錢

右為末。麩糊為丸。如桐子大。每服二十丸。溫水食前。日三服。

槭藤子丸 治腸風瀉血。濕熱內甚。因為諸痔。久而不治。乃變成瘻。

黃耆 枳實 槐花 荆芥穗 鳳眼草 各二錢 槭藤子 一對 炙 皂子 三百

右為細末。麩糊為丸。如桐子大。每服二十丸。空心酒下。米飲亦得。忌油膩冷。猪魚臭血物等。

烏荊丸 治腸風痔疾。大腸悶澀。

川烏頭 二兩 炮 荆芥穗 四兩

右為末。醋麩糊為丸。每服二十丸。如桐子大。溫水下。日三服。

黃耆葛花丸 治腸中久積。熱痔瘻下血。皮痛。

黃耆 葛花 黃赤小豆 花 各一兩 大黃 赤芍藥 黃芩 當歸 各三錢 蛇皮 一

檳榔 白蒺梨 皂角子 仁 各半兩 生地黃 焙 一

右為末。煉蜜和丸。如桐子大。每服二十丸。至三十丸。煎桑白皮湯下。食前槐子煎湯下亦得。

黃連散 一治腸風下血。疼痛不止。

雞冠花 黃連 貫眾 川大黃 烏梅 各一兩 甘草 三分

右為末。每服二錢。用溫米飲調下。日三服。不計時候。

乳香沒藥散 治五種腸風痔瘻。無問久新。

宣黃連 白礬 各一錢 精草 兩 石榴 將黃連白礬碎內入石榴內。用元蓋子合用。

右以濕紙一張裏了後用膠泥拍作餅子裏石榴以炭火燒通赤為度取出去濕紙次將穀精草於銚子內炒焦黃為度與石榴研細後入麝香一錢乳香二錢沒藥一錢研細拌勻每服一錢熱酒小半盞調下日三服

木香厚朴湯

治痔瘻脫肛腸胃間冷腹脹虛脹不思飲食

木香

桂心

桃仁

陳皮

厚朴

兩各一

肉豆蔻

赤石脂

各半兩

皂角子

一兩去皮醋炙黃

大附地三分

右為末每服二錢溫粥飲調下食前

瘡門

瘡疾總論

素問云瘡疾皆生於風其蓄作有時何氣使然夫陰陽上下交爭虛實相移也陽併於陰陰實陽虛寒慄鼓頤此皆夏傷於暑熱氣藏於皮膚之內腸胃之外腠理開得秋氣汗出遇風得之與衛氣併衛氣盡行陽夜行陰氣得陽外出得陰內薄外內相薄是以日作也其有間日者氣深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日作也其作晏與早者邪氣客於風府循脊而下衛氣一日一夜大會於風府其日下一節先客於脊背每至風府則腠理開腠理開邪氣入邪氣入則病作晏也

夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷寒而後傷風故曰先寒而後熱名曰寒瘧先傷於風後傷寒故曰先熱而後寒名曰溫瘧其熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨勝少氣煩冤手足熱欲吐名曰虛瘧有餘則瀉不足補熱為有餘寒為不足已得火不能溫熱已冰水不涼氣陰勝併於陽陽勝併於陰陰勝則寒陽勝則熱故瘡者陰陽風寒虛實邪氣不常之所作也辟邪丹治嵐瘴鬼瘧食瘧併月煩日者

萊豆

雄黑豆各四十粒

信砒半錢 雄黃一錢 硃砂二粒

右為末。同入乳鉢內。滴水為丸。分作三十粒。每服一粒。已用東南桃心。取七枚。研汁。將井花水。早晨日欲出。不出。向日吞之。醋湯亦得。已發日服。

斬邪丹

治諸般瘧疾。無時不止者。

萊豆

小豆三十粒

硃砂

信砒各一錢

右為末。同研細。滴水和丸。勻分作十丸。每服一丸。已早晨服。夜間於北斗下。香水獻至。早晨用新倒流水送下。

斷魔如聖丹

信砒

一錢 蜘蛛大者 雄黑豆四十粒

右為末。滴水和丸。如豌豆大。如來日發。於今晚夜北斗下。獻於早晨。已紙裏於耳內。北一丸立見愈。神聖一粒可醫三人。

辰砂丸

治一切脾胃虛瘧邪熱毒者。

信砒

甘草錢各一 硃砂二錢 大豆四十粒

右為末。滴水和丸。勻分作四十九服。發日早晨。日欲出。煎桃心湯下。忌熱物。

瘧神丹

治諸般瘧疾。

信砒

一兩 雄黃一錢

右以於五月。重五日。用錢子尖拌勻。研三十下。日未出。不令雞犬婦人見。丸如桐子大。未發前一日。面東冷水下一丸。

逐鬼丹

治一切瘧疾神効。

輕粉

荷葉錢各半 甘草一寸

右為末滴水為丸如小豆大。重午日未出。不見雞犬婦人。脩合。每服一丸。無根水下。平日夜視
北斗。來日服忌熱物。

黃帝素問宣明論方卷之十四

眼目門

眼科總論

素問云。目得血而能視。手得血而能握。其證足厥陰之經絡所主。肝臟受虛。而即補腎。實而即瀉心。夫人之眼目者。似天地之日月也。若人無雙目。豈能別辨賢愚。天無日月。萬物安能照耀。是以眼通五臟。氣貫五輪。外應肝候。肝臟虛而風邪鬱。風邪鬱而熱蘊。蘊而火炎上行。故攻目昏。滲溢疼痛。赤絲皆發。榮衛實。則能視。榮衛虛。則昏暗。凡人多食熱物。或嗜五辛坐濕。當風凌寒。冒暑。將息失度。皆喪目之源也。

黃連膏 治一切眼目。瘵肉攀睛。風痒淚落不止。

朴硝入土以水半升。淨去土陰乾用。

黃連半斤 白丁香五升以水一斗。淨去土。攪細用。

右取水入硝香釜內熬至七分。淘出。令經宿水面浮牙者。取出挖乾。以紙袋于盛風中懸至風化。將黃連細末熬清汁曬乾。硝用豬羊膽和氣蜜妙點之效矣。

滌昏膏 治一切風眼。疼痛不可忍。者洗之妙矣。

好崖蜜斤 黃連一兩 沒藥半兩 黃丹一兩。紫色炒。

右入蜜同熬黑。煎黃連成稠汁。入二味藥內。煎熬稠。更入沒藥末。同熬數沸。濾去滓。洗甚妙。後更用通天散。嚙鼻。

通天散 治偏正頭疼并夾腦風通一切壅滯明目。

赤芍藥 川芎

黃連

黃芩

玄胡索

草烏頭

當歸

乳香別研各等分

右為細末每服少許。紙撚子蘸藥任之。鼻喘神効。

神言散 治風熱上攻頭目眩痛。上壅鼻塞眼昏。并牙齦悶痛。

川芎 鬱金各二錢 荊芥穗分 薄荷分 華二盆 硝二錢 紅豆一錢 末入盆 硝細

右研勻。鼻內喘三兩刻。耳力慢加藥。病甚者兼夜喘之。凡熱多風少。隨證選用諸藥。

金絲膏 治一切目疾。昏暗如紗。羅所遮。或夜或痛。

宣黃連半兩 對碎水一盞 浸半日許 取汁與前汁 煮再添水 半盞蜜一兩

山梔子二錢 尹者 梔碎 取汁與前汁 煮再添水 半盞蜜一兩 白礬一字 井鹽一分 如無以青礬代之

右用銀簪器同熬 十餘沸。用生絹上細紙數重。再濾過。用時常點。

白藥子散 治一切疳眼赤爛。目生翳膜。內外瘡疾。并小兒吐痢。

白藥子兩 甘草半兩

右為末。用豬肝一葉。批開。藥五錢。水一大盞。煮熟。食後服。

胡黃連散 治一切久新赤目。疼痛不能坐卧。并大小人口瘡。

胡黃連 檳榔各半兩 麝香少許

右為細末。研細點之。如口瘡。每服半錢。麝香一字。勻口瘡大小。貼之。忌食魚猪油膩物。

碧霞丹 點一切惡眼。風赤者。

龍腦 麝香 硃砂各二錢 沒藥 乳香 銅青各一錢 鵬砂三錢

右為末。滴水。和丸。如桐子大。每服一丸。新水化開。點之。立効。

菩薩散 治遠年近日。一切眼疾。

菩薩石 金精石 銀精石 太陰石 大陽石 雨餘石 河洛石 礬礬石 雲母石

盧甘石 井泉石 白滑石 紫英石 寒水石 陽起石 猪牙石 代赭石 碧霞石

烏魚骨 青鹽 各一兩 硃砂 半兩 蜜陀僧 兩 銅青 一兩 黃丹 四兩 麝香 腦子 一錢

輕粉 半錢 鵬砂 三錢 乳香 二錢 雄膽 一斤 白砂蜜 二力

右為細末以井花水九碗熬就作四碗點水內落下錢許大不散可如散者再熬濾淨過露

旋點

石膏羌活散 治久患雙目不覩光明遠年近日內外氣障風昏暗拳毛倒睫一切眼疾

羌活 治腦熱眼風 蜜蒙花 治羞明 木賊 退翳障 香白芷 清利頭目 細辛

乾菜子 二味起 麻子 起拳 川芎 治頭蒼朮 明目 甘草 解諸毒

荊芥穗 生薑 中 黃芩 退熱 石膏 二味 藁本 治偏正 甘菊 花

右為末每服一錢至二錢食後臨臥用蜜水一盞調下或清茶或淘米第二遍泔亦得日進三

服至十日漸明服至二十日大驗此方醫數十餘人矣

重明散 治一切風熱內外障氣眼疾

川獨活 川羌活 川芎 吳射干 仙苓脾 防風 甘草 井泉石 蒼朮 各半兩

丹參 白朮 石決明 草決明 各三分

右為末每服二錢水一盞半煎至一盞溫服日進三服食後

雷嚴丸 治男子婦人肝經不足風邪內乘上攻眼暗淚出羞明怕日多見黑花生障翳膜遮睛臉

生風粟或痒或痛隱澁難開兼久患偏正頭疼牽引兩目漸覺細小視物不明皆因腎水不能溉

濟於肝水此藥久服大補腎藏添目力

肉從蓉 一兩 牛膝 一兩 芭豆 一兩 浸一宿 菊花 二兩 黑附子 同煮為二錢以河水三升 枸杞子 兩

川椒 三兩 去目

宣明論方 卷十四

右為末。元浸藥酒。煮麪糊為丸。如桐子大。每服十丸。空心酒下。世人服藥。不知多少根源。往往不効耳。

丁香復光丸

治一切遠近目疾。

丁香二錢

芭豆一錢

去皮油

半夏二兩

烏梅半兩

去核

南鵬砂

錢三

腦子二百

盆硝半兩

縮砂仁二錢

甘草半兩

荆芥穗二錢

右為末

醋煮麪糊為丸

如菜豆大

每服十丸

至十五丸

米泔下

食後日三服

已上諸方。係先生親驗可錄。

小兒門

小兒科論

素問云。身熱惡寒。戰慄驚惑。皆屬熱證。為少陰君火。暴強直支。經戾。裏急筋縮也。皆屬風證。為厥陰風木。大小兒六歲之上。為小兒十八歲已上。為少年。其六歲已下者。諸經不裁。是以乳下嬰兒。有病難治。無可定也。然小兒與大人。不可一例。各異治之。雖小兒誕生。襁褓之後。骨肉脆軟。腸胃細微。可以乳食。調和臟腑。乃得平安。肌膚滋潤。筋骨輕嫩。以綿衣之。故生壅滯。內有積熱。熱乘於心。心受。乃發為驚。驚不止。返為潮搖。則為病也。大藥小病者。純陽熱多。冷少。故引。素問少陰。厥陰證。以小兒病驚風熱多矣。小兒驚風者。皆由心火暴甚。而制金不能平木。故風火相搏。而昏冒。驚悸潮熱。此證皆謂熱甚而風生。○素問驚駭驚悸。少陰君火也。小兒脾疳痢瀉者。皆熱甚。急驚瀉痢。色多青。為熱證明矣。痢色黃者。何為火甚。則水衰而脾土旺。故痢色黃也。痢色紅赤者。為心火熱甚深也。痢色黑者。為火熱過極。則反兼水化。制之。故色黑也。五臟皆言熱證。無寒冷證亦有。謂瀉痢。小便青白不澁。為寒水穀不化。而色不變。吐痢。腥穢澄澈清冷。白不澁。身涼不渴。脉遲細而微者。寒證也。

穀雖不化而色變。非白煩渴。小便赤黃而澀者。為之熱證。世傳大人小兒吐痢霍亂。乳食未及消化。而痢尚白。便言論為寒證誤矣。向不脈候別之仲景邪熱不化穀。豈為寒也。大人亦同

小兒方類

龍腦地黃膏○治小兒急慢驚風。痰涎上潮心胸。天吊驚。纏喉風。小兒胸膈不利。一切熱毒。大有神效。如病不已。與分肢散一二服。吐利得快。常服此藥。

川大黃

別甘草

橫文者別

獨麝香

別二錢

雄黃

水蜜者一

生腦子

別一錢

研

研

研

右五味各修製了。再入乳鉢白同研細。煉蜜為膏。油單裏。如有前病煎薄荷湯下。旋丸如皂子大。化下。如小兒大人睡驚。及精神恍惚。煎金銀湯下一丸。常服新汲水下。大解暑毒。如孕婦人常服。新生男女。永無疾病。如有大人陽毒傷寒。加輕粉。二粒龍腦少許。水化下一丸。杏核大小兒看年紀大小。加減服。立效。

分肢散○治小兒卒風。大人人口眼喎斜。風涎畏心。驚癇。天吊。走馬喉閉。急驚。一切風熱等疾。

芭豆

半兩不出油

川大黃

兩一朴硝

半兩

右大黃為末。後入芭豆霜。朴硝。一處細研。用油貼起。如有前患。每服半錢。熱茶下。吐下煩涎立愈。如小兒胃喉驚吊等。先服龍腦地黃膏。一服。次服此藥。一字。茶下時。上吐下瀉。以吐利得快為效。大人半錢。小兒一字。看虛實加減。只是一兩服見效。不宜頻服。如吐瀉不定。以葱白湯立止。

珍珠丸○治小兒虛中積熱。驚癇等疾。

芭豆霜

膩粉

二錢

滑石

二錢

天南星

一錢半

蝎梢

二十箇

續隨子

二十箇

粉霜

右為末。研令極細。以糯米粥為丸。如黃米大。小兒一歲已下。每服三丸。至一丸。十五歲。每服五丸。至十丸。點茶湯下。荊芥湯亦得。虛實加減。

牛黃散○治小兒上焦壅熱諸眼疾。

肉桂

鬱金各一兩

馬牙硝兩

甘草半兩

並牛

右為末。如患眼三五年。喫三五兩便瘥。每服一錢。新汲水調下。垂枕卧片時。若是小兒十歲服半錢。五歲已下。服一字。永無驚。疳。廔。風。患。服之立効。

硃砂丸○治小兒急慢驚風及風熱生涎咽喉不利取驚積。

硃砂

天南星

芭豆霜各一錢

右為末。麝糊和丸。如黍粒大。看病虛實。大小。每服二丸。或天吊戴上眼。每服四五丸。薄荷水下立愈。

鬱金散○治小兒急慢驚風等疾。

鬱金

大者一枚

芭豆大者一枚

不出油

右研為細末。每服一字。煎竹葉湯。放溫下。把藥抄盪唇上。放以湯充下。喉咽為妙。

澤瀉散○治小兒胎前胎上壅熱涎潮。

澤瀉

分蟬殼十一個

黃明膠

手掌大一錢

右為細末。每服一錢。溫米湯調下。日進二服。未愈再服。

鎮庭散○治小兒一切驚喘肚脹咳嗽。

鬱金

大黃

各半兩

甘草

三錢

輕粉一錢

右為末。每服半錢。用薄荷汁。硃砂細研。冷水以木匙漚下。

定命散○治小兒天吊驚風不能哭泣。

梨蘆

川芎

蔚金

各等分

右研為細末。鼻嚕嚕之。如哭可醫。

金肺散○治小兒諸般喘嗽急驚風神効。

錫灰一錢漢防己二錢鬱金一錢洗七次砒黃二錢半夏一錢半湯

右為細末每服半錢加一錢小兒加減煎豬肉湯下日進二服食後

厚朴散○治小兒虛滑瀉痢不止

厚朴 呵子皮研史君子一箇揀丁香一箇茯苓 吳白朮 青皮銹甘草炒

右為末每服一字一歲加減用清米湯下

人參散○治小兒虛熱煩渴因吐瀉煩渴不止及疎轉後服之

人參半兩茯苓二兩半犀三錢甘草半兩乾葛半兩桔梗二錢

右為末每服三錢水一大盞入燈心五莖同煎至六分放溫不計時候煩渴者以新竹湯下量

年紀加減

碧雲散○治小兒驚風有涎

膽礬研兩銅青研分粉霜 輕粉各一錢

右為細末每服一字薄荷湯下中風將水下如吐多不定煎葱白湯投之立止効

桃符丸○治小兒風熱

大黃 郁李仁 黃栢 宣連 蔚金各一芭豆二七個去皮 輕粉

右為細末滴水為丸如菜豆大以硃砂為衣每服二丸用桃符煎湯下看大人小兒加減

黃帝素問宣明論方卷之十五

雜病門

雜論

河間 劉守真 撰集
新安 吳勉學 校

素問云。痛痒瘡瘍。癰疽痘疹。瘤氣結核。拂鬱甚者。皆熱。五臟不和。九竅不通。六腑不和。留結為癰。近於火氣微熱則痒。熱甚則痛。附近則灼而為瘡。皆火之用也。

人之瘡腫。因內熱外虛所生也。為風濕之所乘。則生瘡腫。然肺主氣候。於皮毛。脾主肌肉。氣虛則膚腠開。為風濕所乘。脾氣溫。而內熱。即生瘡也。腫者皆由寒熱毒氣客於經絡。使血澁而不通。壅結成腫。風邪內作。即無頭無根。氣血相搏。作者即有頭有根。結壅盛則為膿。赤核腫則風氣流潰也。瘡以痛痒。痛則為實。痒則為虛。非謂虛為寒也。正謂熱之微甚也。痒者美疾也。故火旺於夏。而萬物蕃鮮。榮美也。炙之以火。漬之以湯。而其痒轉甚者。微熱之所使也。痒去者謂熱。今皮膚縱緩。腠理開通。陽氣得泄。熱散而去。或夏熱皮膚。痒而以冷水沃之。其痒不去。謂寒收斂。腠理閉密。陽氣鬱結。不能散越。拂鬱內作故也。瘡痒皆為火熱。而反腐出膿水者。猶穀肉果菜熱極則腐爛而潰。為污水也。潰而腐爛者。水之化也。癰淺而大。疽深而惡。熱勝血則為癰。膿也。瘍有頭小瘡也。疹浮而小。癰疹也。瘤氣赤瘤。丹燥熱勝。氣火之色也。

如意散

治疥癬無時。痛痒愈發。有時不問久新者。

吳茱萸 牛蒡子

荊芥

各一

牡蠣

半兩

輕粉

半錢

信石

二錢

右為細末。研勻。每臥抄一錢。油調。徧身搓摩。上一半。如後有痒不止。更少許塗之。股臂之間。聞香悉愈。

信効散 治風熱上客陽明之經。牙齒腐蝕。斷宣腐臭出血。色黃氣腐。注悶。動搖疼痛。作發有時。兼解。中金石一切毒藥。

信砒 一錢 黃丹 二錢 十古石灰如無但以陳久者炒細研四錢

右研細末。入青鹽一分。麝少許。如無此二味。亦得。每上抄三兩大豆許。先洗漱淨。以手指蘸藥。搽上下牙齒。斷澀。涎勿嚥之。須臾漱淨。或已蝕處。再上少許。二三四次。常用如意。一上以為妙。或服金石藥致病。便一日三四上。更不上牙齒如神。或已上牙齒者。傳之即愈。或平人常用。頗能清利頭目。寬膈美食。使髮鬚遲白。久用亦能固牙齒。便遲。老人氣於面。而手足陽明經絡貫注。憂思則氣結。而血液不行。燥。拂鬱而血衰。不能榮養臟府。故早蒼黃而斑白也。此藥能使陽明氣血宣通。故効能然也。又方便龍骨。不用石灰。

神聖餅子 治一切打撲傷損。金石刀刃。血出不止者。立効。此藥上無膿。退痂便愈。

烏魚骨 一兩 五月五日前准備下

高莖菜 握青薊草 一握約一虎口人

石灰 四兩

右以五月五日。日未出。本人不語。將取三味。同杵爛。次後下餘藥味。杵得所搏。作餅子。曬乾。用時旋刮敷之。

芙蓉膏 治徧滿頭面。大小諸瘡。子或身體者。

料炭灰 桑柴灰 蕎麥殼灰 各半升

右灰。用熱湯淋取二升。熬至五分。又用

獨角仙 一個 不

紅娘子 半錢 不

糯米 九粒 石灰 一兩 風

右為末。將前項灰。調如麪糊。相似。在甕合子內。於土底埋五七日。取出使用。取瘰癧。同刺破。用細竹簽子點之。放藥。用濕紙措藥。再點至三上。見瘰癧痕。時冷水淋洗。忌薑醋。魚。馬肉。鈐白霜散。治大小人口瘡。牙齒腐蝕。氣臭血出者。

鉛白霜錢銅錄二錢白礬一塊

右為末以翎羽埽上瘡以溫漿水救之

麝香散 治大小人口齒蝕腐出血斷根宣爛者

上好鹹土不以多計 麝香真好者

右熱湯淋取汁去滓用清汁銀石器中熬乾刮下再與麝香同研勻捺於瘡上以紙貼神効

乳香散 治一切瘰癧瘡新久遠近不已者

乳香一錢砒霜一錢硃砂半錢紅娘子二十四個黃丹半錢

右為末糯米粥和作餅子如折三錢厚小銅錢裏搥大破瘡上白芨糊如不破者灸柴炷大者

不過一月其瘰癧核自下

後敘瘡生肌藥 黃藥不以多少

為細末新糊塗患處其妙

五香丸 治一切惡瘡瘰癧結核無首尾及諸瘡腫

沉香 木香 雞古香各一兩 黃陸香 麝香各三連翹半兩

右研為細末每服二錢水一盞煎至六分不拘時

紫參丸 治熱毒瘰癧腫痛已內消瘡已破出膿水服此藥

紫參 苦參各一連翹二兩丹麥一兩膩粉三錢麝香三錢滑石二兩

右為末別用玄參一斤搗碎以酒三碗浸三日揉取汁去滓用皂角子三伯枚煨熟搗為末用

玄參酒熬皂子末成膏和前藥如桐子大每服一丸以黃耆湯下一日加一丸至患人歲數即

止如四七則二十每日却減一丸瘡自乾有結內消

麝香雄黃散 治十七般惡蟲咬傷人及瘡腫者

麝香 雄黃

乳香

硃砂 硃砂 土蜂窩

露蜂窩 燒灰

右研為細末以醋調少許塗或着處或不辨認得多疑是惡瘡三五日不瘳即毒入心難瘳忌

硃砂散 治一切疥瘡

硃砂

雄黃

天南星

砒霜

各等麝香少許

右研為細末用竹針針開用藥到黃水出瘡已

聖力散 治諸疥瘡腫

草烏頭 白及

白斂

木鱉子 蛇地龍

金毛狗脊各二錢半麝香三錢黃丹少許

川山甲散 治一切通氣破瘡腫行膿血如神妙

川山甲

木鱉子

烏龍角 蛇等分都

守瘻丸 治瘻癰結硬

通草 二兩

杏仁一大合去

牛蒡子一合出

吳射干

昆布去鹹 呵梨勒

海藻各四兩去

右為末煉蜜為丸如彈子大含化咽津下日進三服

鬼代丹 治打不着痛

無名異 研沒藥研

乳香研

自然銅 醋淬研

地龍去土 木鱉子去殼各

右為末煉蜜為丸如彈子大溫酒下一丸打不痛

龍腦潤肌散

治杖瘡熱毒疼痛

黃丹一兩蜜陀僧半兩輕粉一錢麝香半兩龍腦一字

右為細末。摻藥在瘡上用青白子塗之內留一眼子。

香藥丸 治瘰癧瘡。

硃砂 乳香 沒藥 半夏 輕粉 赤石脂各等

右為末。糯米粉為丸。如桐子大。每服十丸。加至二十丸。皂角子臨臥。

紅玉挺子 治一切牙疳。

砒霜一塊皂角子大黃丹煨過魯土

右為細末。餵餅和作劑子任牙。

桃花散 治一切瘡生肌藥。

白及 白斂 黃柏 黃連 乳香別研麝香別研黃丹各等

右為細末。摻於瘡上。二三日。生肌肉滿。

追毒散 治生瘡發悶吐逆霍亂。

螺兒青 棟甘草各一兩白礬二錢半

右為細末。每服一錢。新汲水調下。立吐。

膽礬丸 治男子年少而髮髮斑白。

土馬騾燒存性石馬騾燒存性半夏各一兩生薑一兩胡桃十個真膽礬半兩

川五倍子一兩

右為末和作一塊。絹袋子盛。如彈子大。熱酒水各少許。浸下。藥汁淋洗頭髮。一月神效。

伏神散 治膽熱多睡神思不安昏悶。

伏神去皮麥門冬地骨皮茯苓各一兩白鮮皮 酸棗仁 沙參 甘草酸半

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓食後服
鐵脚丸 治大小便不通

皂角炙去皮不以多少去却子

右為末酒新糊為丸如桐子大每服三十丸酒服

全聖散 治小腸膀胱氣痛不忍者

地膽半兩去足翅微炒 滑石一兩 硃砂半錢

右為末每服二錢用苦杖酒調下食前服

琥珀散 治五淋

滑石二兩 木通 當歸 木香 尉金 扁竹略一 琥珀二兩

右為末每服三五錢用蘆葦葉同煎食後日三服

葵子散 治小便不通

葵子 茯苓去黑皮各等分

右為末每服四錢水一盞煎三沸食前

倒換散 治無問久新癰悶不通小腹急痛肛門腫疼

大黃通減半 荊芥穗大便秘不通減半各等分

右件藥味各別為末每服一二錢溫水調下臨時加減服

敗毒散 治男子往來寒熱婦人產後骨蒸血運

大黃 黃藥子 紫何車 赤芍藥 甘草各等分

右為末每服一錢如發熱冷水下如發寒煎生薑荳蔻湯同調下此藥偏治婦人

補真丹 治男子元氣虛冷興陽固腎不虛

黑附子 一兩煨

陽起石 火燒酒

海馬 二錢乳香

雄黃 為衣 血竭 各三錢

石蓮子 去殼皮心

黑錫 炒去砂子半兩

石鷲子 燒以醋淬

麝香 一分

右為細末。麝糊為丸。每服二十丸。用五香湯空心下。

五香湯

沉香

箋香

乳香

麝香

檀香 各等

右為細末。每服半錢。煎湯下。

新添

醉烏法。治頭鬚白。再黑方。

訶藟勒 十個不

醋石榴 三個大

硃礬 五分 生地黃汁 一升

硃砂 研

硫黃 研各

右藥同入瓷瓶內。用二味汁浸密封。勿令透氣。至四十九日後取出。其訶子狀若黑梅。至夜臨

卧含一枚。嚥津到曉爛嚼。以酒一盞下之。三二日後再服。忌葱大蒜蘿蔔。

千頃堂書局出版廣告

▲脈學指南▼

吾國醫學為世界最古之哲學亦最切實用之藝術奈政景之書理極深奧後人著述蕪雜居多欲求闡發奧旨洞明虛實之作實不多觀本局有鑒於此不惜重金多方搜求印行濟世茲復得山左盧敬之先生所著脈學指南一書遍請著名醫家評閱僉謂精微透徹發前人所未發足為後學津梁著作權歸於本局爰亟付印並略撮是書優點以告有志斯道者諒當先觀為快也 是書專取內經難經及傷寒論金匱要略等書融會貫通發為議論所謂以經解經洵非學有根底者不能與徒逞臆說者有霄壤之判 是書詳言脈之形象及病之所以然以及種種變化熟讀之臨診辨症自能確有把握非板滯不靈之脈訣書可比 是書雖祇八萬餘言然詳略適宜於脈互勘處晰疑辨難已屬無微不至彰以少勝多足稱字字珠璣 是書經大文豪章太炎先生序之篇首其價值如何概可想見書用本國連史紙精印裝訂四冊清朗悅目猶其餘事定價壹圓


羅茂亭輯

中西醫粹

附唐容川痢症三字訣
張子培
春溫三字訣
每部四冊
定價六角

○退思廬醫書四種○

本書四種為慈谿名醫嚴病孫先生所新輯曰感證輯要四卷六經感證莫不概括名論良方無乎不備曰女科精華三卷曰女科醫案選粹四卷曰女科證治約旨四卷慨女科之盲治而會集前說擷其精華詳述醫案之由來刺取古方之良要蓋女科之完書焉先生溝通中西蜚聲醫界本其心得輯為此書卷首有嚴範孫先生一序具言臨症二十餘年既以經驗筆之於書又兼中西國名論以資旁證以範孫先生之舉望豈肯阿私所好者則此書之價值可知矣今由本局精印趕行出版不特醫界之宜購即各界之居家旅行者均應各置一編以備遇證揀方之用矣精裝八冊連史紙定價洋二元五角有光紙定價洋壹元六角



E783L

1909

v. 2